


令和8年産 稲作情報 第10号

令和8年9月25日

JA全農みやぎ

～長雨時の 水稻の収穫作業等について～

1 令和8年の気象経過（古川アメダス）と東北地方の1か月予報



◆9月24日発表 東北地方の1か月予報(9/26～10/25 までの天候見通し)【気象庁ホームページより】

- ・天気は数日の周期で変わる。東北南部では、期間のはじめも降水量が多く、日照時間の少ない状態が続く見込み。
- ・向こう1か月の気温は、高い確率60%、平年並みの確率30%、低い確率10%。
- ・降水量は、多い確率40%、平年並み若しくは少ない確率30%。
- ・日照時間は、東北太平洋側では、多い確率40%、平年並み若しくは少ない確率30%。

気温、降水量、日照時間の各階級の確率 (%)			
気温	東北地方	向こう1か月 09/26～10/25	10 30 60
		1週目 09/26～10/02	10 20 70
		2週目 10/03～10/09	30 50 20
		3～4週目 10/10～10/23	20 30 50
降水量	東北地方	向こう1か月 09/26～10/25	30 30 40
日照時間	東北日本海側	向こう1か月 09/26～10/25	30 40 30
	東北太平洋側	向こう1か月 09/26～10/25	30 30 40

■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

2 8年産水稻の刈取状況（9月17日現在 宮城県記者発表資料より抜粋）

- ・ 県全体的水稻刈取進捗率は2.6%で、刈取始期（5%）に達していない。刈取始期の平年値は9月18日、前年は9月14日であり、降雨の影響等により、平年より遅れている。

①地方振興事務所・地域事務所別

地区名	水稻作付面積 (ha) [注]	9月17日現在刈取状況		刈取 (月日)			(参考) 平年値		
		刈取面積 (ha)	進捗率 (%)	刈取始期	刈取盛期	刈取終期	刈取始期	刈取盛期	刈取終期
大河原	6,628	438	6.6	9/17	未	未	9/14	9/29	10/16
仙台	12,012	220	1.8	未	未	未	9/18	9/30	10/15
大崎	18,715	559	3.0	未	未	未	9/19	9/29	10/11
栗原	9,694	164	1.7	未	未	未	9/20	10/1	10/16
登米	10,307	20	0.2	未	未	未	9/21	10/1	10/15
石巻	7,100	258	3.6	未	未	未	9/17	9/28	10/12
気仙沼	640	17	2.7	未	未	未	9/19	10/2	10/15
県計	65,096	1,676	2.6	未	未	未	9/18	9/30	10/14

[注]作付見込面積は令和7年産の水田における作付状況(令和7年9月15日時点)の主食用米面積を用いた。
※刈取始期、刈取盛期、刈取終期は、進捗率がそれぞれ5%、50%、95%に達した時期をいう。
※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
※平年値は平成28～令和7年の10か年のうち最も早い年と最も遅い年を除いた8か年の平均値。

②地帯区分別

地帯区分	水稻作付面積 (ha) [注]	9月17日現在刈取状況	
		刈取面積 (ha)	進捗率 (%)
山間高冷	941	7	0.7
西部丘陵	5,332	143	2.7
北部平坦	43,627	824	1.9
南部平坦	5,445	394	7.2
三陸沿岸	1,278	74	5.8
仙台湾沿岸	8,475	234	2.8
県計	65,096	1,676	2.6

[注]作付見込面積は令和7年産の水田における作付状況(令和7年9月15日時点)の主食用米面積を用いた。
※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

3 刈取適期の判定（晩生品種）

- ・ 県全体の出穂期（ひとめぼれ主体）は8月1日で、平年並みであった。

表3 県内の出穂状況

区 分	出穂始期 (5%)	出穂期 (50%)	穂揃期 (95%)
本 年	7月26日	8月1日	8月14日
平 年	7月28日	8月1日	8月9日
平年差	2日早い	平年並	5日遅い
(参考)前年	7月25日	7月30日	8月6日

※平年値は平成28～令和7年の10ヶ年のうち最も早い年と最も遅い年を除いた8ヶ年の平均値。

- ・ 宮城県内で作付けされている、主要な晩生品種の出穂後の積算平均気温（出穂日翌日からの平均気温を毎日加算していったもの）は、下記のとおりである。

- つ や 姫 1,000～1,200℃
- にじのきらめき 1,100～1,200℃
- Z R 2（試験展示ほ） 1,050～1,250℃
- 参考；ひとめぼれ 940～1,100℃

◎出穂後の積算平均気温から算出した刈取適期の目安は、次ページからの表（網掛け部分）を参照する。なお、アメダスデータは9月23日までは実測値を、9月24日以降は平年値を用いて算出している。

◆「にじのきらめき」及び「Z R 2」の出穂期については、各地区に設置した「試験展示ほ」の実測値である。

【つや姫】(積算平均気温;1,000~1,200℃)

- ・下表の出穂期は、宮城県が発表した各地区の「ひとめぼれ」の平均出穂期として計算しているの
で、注意する（つや姫は、一般的にひとめぼれより出穂期は10日程度遅い）。

◆宮城県古川農業試験場の作況試験ほにおける「つや姫」の出穂期（5/11 植）は、8/14であった。

アメダス	丸 森	白 石	亘 理	仙 台	大 衡	古 川	鹿島台	築 館	米 山	気仙沼	石 巻	
出穂期(各地区)	8月4日	8月4日	7月31日	7月31日	7月31日	8月1日	8月1日	8月4日	7月31日	8月6日	7月31日	
刈取適期	曜日	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	
9月1日	火	433.5	427.8	527.0	545.5	525.8	505.3	503.7	430.9	531.0	377.5	530.0
9月19日	土	810.3	798.5	907.6	933.7	895.4	874.2	874.8	794.9	899.9	739.7	904.6
9月20日	日	831.7	819.7	929.2	955.9	916.9	895.8	896.4	816.3	921.5	760.8	926.0
9月21日	月	853.0	841.0	950.8	977.5	938.3	917.4	918.0	837.8	943.1	782.2	947.5
9月22日	火	875.4	863.2	973.8	1001.4	960.6	939.3	939.9	859.3	964.8	803.9	969.8
9月23日	水	893.9	881.8	993.0	1021.9	979.8	958.3	958.9	877.6	983.3	822.7	989.4
9月24日	木	912.3	900.1	1,011.9	1,041.4	997.8	976.4	977.0	895.5	1,001.5	840.6	1,008.3
9月25日	金	930.5	918.2	1,030.7	1,060.7	1,015.6	994.3	994.9	913.1	1,019.5	858.3	1,027.0
9月26日	土	948.6	936.1	1,049.3	1,079.9	1,033.2	1,012.0	1,012.6	930.5	1,037.3	875.9	1,045.5
9月27日	日	966.5	953.9	1,067.7	1,098.9	1,050.6	1,029.5	1,030.2	947.8	1,054.9	893.3	1,063.8
9月28日	月	984.3	971.5	1,086.0	1,117.8	1,067.9	1,046.9	1,047.6	964.9	1,072.3	910.5	1,082.0
9月29日	火	1,001.9	989.0	1,104.2	1,136.5	1,085.0	1,064.1	1,064.8	981.8	1,089.6	927.6	1,100.0
9月30日	水	1,019.4	1,006.3	1,122.2	1,155.1	1,101.9	1,081.1	1,081.9	998.5	1,106.7	944.5	1,117.9
10月1日	木	1,036.7	1,023.5	1,140.1	1,173.5	1,118.6	1,097.9	1,098.8	1,015.1	1,123.6	961.3	1,135.6
10月2日	金	1,053.9	1,040.5	1,157.8	1,191.8	1,135.2	1,114.6	1,115.6	1,031.5	1,140.4	977.9	1,153.2
10月3日	土	1,070.9	1,057.4	1,175.4	1,209.9	1,151.6	1,131.1	1,132.2	1,047.7	1,157.0	994.3	1,170.6
10月4日	日	1,087.7	1,074.1	1,192.8	1,227.8	1,167.8	1,147.4	1,148.6	1,063.7	1,173.4	1,010.6	1,187.8
10月5日	月	1,104.3	1,090.7	1,210.1	1,245.5	1,183.8	1,163.5	1,164.8	1,079.5	1,189.6	1,026.7	1,204.9
10月6日	火	1,120.7	1,107.1	1,227.2	1,263.1	1,199.6	1,179.4	1,180.8	1,095.1	1,205.6	1,042.6	1,221.8
10月7日	水	1,136.9	1,123.3	1,244.1	1,280.5	1,215.2	1,195.1	1,196.6	1,110.5	1,221.4	1,058.3	1,238.5
10月8日	木	1,152.9	1,139.3	1,260.8	1,297.7	1,230.6	1,210.6	1,212.2	1,125.7	1,237.0	1,073.8	1,255.0
10月9日	金	1,168.7	1,155.2	1,277.3	1,314.7	1,245.8	1,225.9	1,227.6	1,140.7	1,252.4	1,089.1	1,271.3
10月10日	土	1,184.3	1,170.9	1,293.7	1,331.5	1,260.8	1,241.0	1,242.8	1,155.5	1,267.6	1,104.2	1,287.4
10月11日	日	1,199.7	1,186.4	1,309.9	1,348.1	1,275.5	1,255.9	1,257.8	1,170.1	1,282.6	1,119.1	1,303.3
10月12日	月	1,214.9	1,201.7	1,325.9	1,364.5	1,290.0	1,270.6	1,272.6	1,184.5	1,297.4	1,133.8	1,319.0
10月13日	火	1,229.9	1,216.7	1,341.7	1,380.7	1,304.3	1,285.1	1,287.2	1,198.6	1,312.0	1,148.3	1,334.5
10月14日	水	1,244.7	1,231.5	1,357.3	1,396.7	1,318.4	1,299.3	1,301.6	1,212.5	1,326.4	1,162.6	1,349.8
10月15日	木	1,259.3	1,246.1	1,372.7	1,412.5	1,332.3	1,313.3	1,315.7	1,226.2	1,340.5	1,176.7	1,364.9
10月16日	金	1,273.7	1,260.5	1,387.9	1,428.1	1,346.0	1,327.1	1,329.6	1,239.7	1,354.4	1,190.6	1,379.8
10月17日	土	1,287.8	1,274.7	1,402.9	1,443.5	1,359.5	1,340.7	1,343.3	1,252.9	1,368.1	1,204.3	1,394.5
10月18日	日	1,301.7	1,288.7	1,417.7	1,458.7	1,372.8	1,354.1	1,356.8	1,265.9	1,381.6	1,217.8	1,409.0

- ・「つや姫」は、刈り遅れると茶米や碎粒が発生しやすくなるので、適期に収穫することが重要である。

【にじのきらめき】(積算気温;1,100~1,200℃)

アメダス		丸森	蔵王	亘理	大衡	石巻
出穂期(各地区)		8月18日	8月18日	8月19日	8月17日	8月14日
刈取適期	曜日	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温
9月1日	火	338.1	326.4	314.7	359.3	435.4
9月23日	水	798.5	771.3	780.7	813.3	902.4
9月24日	木	816.9	789.2	799.6	831.3	921.3
10月3日	土	975.5	943.3	963.1	985.1	1,083.6
10月4日	日	992.3	959.7	980.5	1,001.3	1,100.8
10月5日	月	1,008.9	976.0	997.8	1,017.3	1,117.9
10月6日	火	1,025.3	992.1	1,014.9	1,033.1	1,134.8
10月7日	水	1,041.5	1,008.0	1,031.8	1,048.7	1,151.5
10月8日	木	1,057.5	1,023.7	1,048.5	1,064.1	1,168.0
10月9日	金	1,073.3	1,039.1	1,065.0	1,079.3	1,184.3
10月10日	土	1,088.9	1,054.3	1,081.4	1,094.3	1,200.4
10月11日	日	1,104.3	1,069.2	1,097.6	1,109.0	1,216.3
10月12日	月	1,119.5	1,083.8	1,113.6	1,123.5	1,232.0
10月13日	火	1,134.5	1,098.2	1,129.4	1,137.8	1,247.5
10月14日	水	1,149.3	1,112.3	1,145.0	1,151.9	1,262.8
10月15日	木	1,163.9	1,126.2	1,160.4	1,165.8	1,277.9
10月16日	金	1,178.3	1,139.9	1,175.6	1,179.5	1,292.8
10月17日	土	1,192.4	1,153.4	1,190.6	1,193.0	1,307.5
10月18日	日	1,206.3	1,166.7	1,205.4	1,206.3	1,322.0
10月19日	月	1,220.0	1,179.9	1,220.0	1,219.4	1,336.3
10月20日	火	1,233.5	1,192.9	1,234.4	1,232.3	1,350.4
10月21日	水	1,246.8	1,205.8	1,248.6	1,245.0	1,364.3

【ZR2試験展示ほ】(積算気温;1,050~1,250℃)

アメダス		丸森	蔵王	亘理	大衡	石巻
出穂期(各地区)		8月16日	8月16日	8月17日	8月15日	8月16日
刈取適期	曜日	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温
9月1日	火	386.2	374.1	363.9	406.8	388.1
9月23日	水	846.6	819.0	829.9	860.8	847.5
9月24日	木	865.0	836.9	848.8	878.8	866.4
10月4日	日	1,040.4	1,007.4	1,029.7	1,048.8	1,045.9
10月5日	月	1,057.0	1,023.7	1,047.0	1,064.8	1,063.0
10月6日	火	1,073.4	1,039.8	1,064.1	1,080.6	1,079.9
10月7日	水	1,089.6	1,055.7	1,081.0	1,096.2	1,096.6
10月8日	木	1,105.6	1,071.4	1,097.7	1,111.6	1,113.1
10月9日	金	1,121.4	1,086.8	1,114.2	1,126.8	1,129.4
10月10日	土	1,137.0	1,102.0	1,130.6	1,141.8	1,145.5
10月11日	日	1,152.4	1,116.9	1,146.8	1,156.5	1,161.4
10月12日	月	1,167.6	1,131.5	1,162.8	1,171.0	1,177.1
10月13日	火	1,182.6	1,145.9	1,178.6	1,185.3	1,192.6
10月14日	水	1,197.4	1,160.0	1,194.2	1,199.4	1,207.9
10月15日	木	1,212.0	1,173.9	1,209.6	1,213.3	1,223.0
10月16日	金	1,226.4	1,187.6	1,224.8	1,227.0	1,237.9
10月17日	土	1,240.5	1,201.1	1,239.8	1,240.5	1,252.6
10月18日	日	1,254.4	1,214.4	1,254.6	1,253.8	1,267.1
10月19日	月	1,268.1	1,227.6	1,269.2	1,266.9	1,281.4
10月20日	火	1,281.6	1,240.6	1,283.6	1,279.8	1,295.5
10月21日	水	1,294.9	1,253.5	1,297.8	1,292.5	1,309.4

4 収穫・乾燥調製のポイント

(9月18日発表 宮城県米づくり推進本部情報 臨時号より抜粋)

(1) 収穫作業

- ・本年は特にほ場ごとの出穂時期、刈取適期の差が大きい傾向にあることから、ほ場ごとの籾色や倒伏程度等を確認して刈取順序を決める。
- ・降雨によって水が溜まっているほ場では、溝切や排水路の手直しにより表面排水を促す。
- ・コンバイン収穫では籾水分が高いと損傷が多くなるだけでなく、機械詰まりの原因や穀粒損失割合の増加につながる。籾水分 25%以下を目標に収穫を行い、降雨直後や朝露のある時間帯を避ける。
- ・コンバインの詰まりを防ぐため、速度を落として作業する。
- ・倒伏した部分は、刈り分けを行い、石などの異物が混入しないように注意する。
- ・鉄コーティング直播は特に倒伏しやすいので、刈取適期に達したら早めに刈り取る。

(2) 乾燥・調製作業

- ・収穫した生籾を放置すると発熱して変質米の原因となることから、刈取後は速やかに乾燥機に張り込み、送風する。やむを得ず高水分籾を刈り取った場合は、必ず通風して高水分域の籾や付着水を乾かし、水分バランスを少なくしてから火力乾燥する。
- ・水分ムラが大きい場合、低水分籾が過乾燥となりやすく、胴割粒の原因となる。倒伏した稲や未熟粒が多い稲などを機械乾燥する場合、二段乾燥（籾水分が 20%以下になるまで乾燥した後、乾燥を一時停止し、籾の水分ムラが少なくなってから再度仕上げ乾燥を行う）を行い、水分ムラや胴割粒の発生を抑える。
- ・仕上がり玄米水分は、14.5%から 15.0%が目標である。正確な水分測定のために、玄米の測定サンプルから未熟粒を取り除いて測定する。また、こまめに水分を測定し、過乾燥を防ぐ。
- ・青米が多い場合は、乾燥終了後に水分の戻りが生じる場合があるので注意する。
- ・籾水分の戻り等で籾水分が高くなると、特にロール式籾摺り機では脱ぶ率が低下し、肌ずれが多くなるので、籾摺り前に籾水分を再度測定し、水分が高い場合には再乾燥を行う。