


令和8年産 稲作情報 第8号

令和8年8月12日
JA全農みやぎ

～県全体の出穂期は 平年並みの8月1日～

～出穂後の積算平均気温を参考に 刈取計画を立てる～

1 令和8年の気象経過（古川アメダス）と東北地方の1か月予報



◆8月6日発表 東北地方の1か月予報(8月8日～9月7日までの天候見通し)【気象庁ホームページより】

- ・天気は数日の周期で変わる。
- ・向こう1か月の気温は、高い若しくは平年並みの確率40%，低い確率20%。
- ・降水量は、多い若しくは平年並みの確率30%，少ない確率40%。
- ・日照時間は、多い若しくは平年並みの確率30%，少ない確率40%。

気温、降水量、日照時間の各期間の確率 (%)			
気温	東北日本海側	向こう1か月 08/08～09/07	20 30 50
		1週目 08/08～08/14	20 50 30
		2週目 08/15～08/21	20 30 50
		3～4週目 08/22～09/04	10 30 60
	東北太平洋側	向こう1か月 08/08～09/07	20 40 40
		1週目 08/08～08/14	50 30 20
		2週目 08/15～08/21	30 50 20
		3～4週目 08/22～09/04	10 30 60
降水量	東北日本海側	向こう1か月 08/08～09/07	50 30 20
	東北太平洋側	向こう1か月 08/08～09/07	40 30 30
日照時間	東北日本海側	向こう1か月 08/08～09/07	20 40 40
	東北太平洋側	向こう1か月 08/08～09/07	40 30 30

■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

2 生育状況

(1) 出穂状況（8月3日現在、宮城県みやぎ米推進課発表）

- ・8月3日現在、水稻作付面積の59%の水田で出穂期に達している。**県全体の出穂期は8月1日で、平年並であり、前年より2日遅い。**

出穂状況（県全体）

区 分	出穂始期 (5%)	出穂期 (50%)	穂揃期 (95%)
本 年	7月26日	8月1日	未
前 年	7月25日	7月30日	8月6日
平 年	7月28日	8月1日	8月9日
平年差	2日早い	平年並み	-

区 分	出穂始期 (5%)	出穂期 (50%)	穂揃期 (95%)
大河原	7月27日	未	未
仙台	7月25日	7月31日	未
大崎	7月26日	8月1日	未
栗原	7月24日	未	未
登米	7月28日	7月31日	未
石巻	7月28日	7月31日	未
気仙沼	7月30日	未	未

3 今後の管理

(1) 出穂後の水管理

- ・**出穂後は10日程度の湛水管理を基本とし、高温が続く場合は、水を切らず土壌を湿った状態に保つ「飽水管理(ほうすいかんり)」を徹底する。飽水管理の方法については、稲作情報 第7号(前号)を参照されたい。**
- ・さらなる台風の発生及び東北地方への接近が予報されている。台風通過後は、フェーン現象による高温と乾燥が発生しやすいため、その際は速やかに灌水し、水を切らないようにする。

(2) 病虫害防除【宮城県病虫害防除所】

① いもち病

- ・病虫害防除所が7月23日に発表した「発生予報 第4号」によれば、穂いもちの発生時期及び発生量は「平年並み」と予測されている。
- ・定点調査ほ（品種；ひとめぼれ）における葉いもちの発病株率及び株当たり病斑数は平年より多かった。
- ・巡回調査の結果、葉いもちの発生地点率は平年並み、発病株率は平年よりやや高かった。
- ・葉いもちの上位葉での発病は、穂いもちの伝染源となるため、葉いもちの発生が確認された場合は速やかに茎葉散布剤を散布する。
- ・直播栽培では、移植栽培より生育ステージが遅く、全般に葉色が濃く推移しやすいことから、葉いもちが発生しやすく、穂いもちに移行しやすい傾向があるので、茎葉散布剤による防除を実施する。

② 紋枯病

- ・病虫害防除所の巡回調査によれば、発生地点率及び発病株率は平年よりやや低かった。
- ・出穂前に、畦畔の草刈りが間に合わず、風通しが悪いような条件で多発する傾向がある。
- ・**要防除水準については、稲作情報第7号（前号）を参照のこと。**

③ 斑点米カメムシ対策（病虫害防除所 注意報 第1号（7月23日発行）より一部抜粋）

- ・**巡回調査の結果、本田周辺の畦畔では斑点米カメムシ類の発生地点率は平年よりやや高く、調査地**

点の9割で発生が確認された。そのため、県病虫害防除所では7月23日付けで「注意報 第1号」を発表し、防除の徹底を呼び掛けている。

- ・斑点米カメムシ類の防除対策については、稲作情報第7号（前号）を参照のこと。

4 刈取適期の見込み【速報値】

- ・出穂後の積算平均気温（出穂期翌日からの平均気温を毎日加算していったもの）による刈取適期の目安は、「ひとめぼれ」の場合940～1,100℃である。下表の網掛け部分を目安に、適期刈取の計画を立てる。

→大河原地区（丸森、白石）、栗原地区（築館）及び気仙沼地区は、8月3日現在、まだ出穂期に達していないため、この頃に出穂期に達するという見込みで作成したので、留意願いたい。

- ・出穂期は宮城県が発表した各地区ごとの「平均出穂期」として計算しているので、注意する。
5月上旬植えのように移植の早いものや、早生品種では刈取適期はさらに早まる。
- ・前年のような猛暑が続けば、刈取適期はさらに数日は前倒しになる可能性がある。

◆早い地域では、9月8日頃から、刈取適期に入る見込みである。

アメダス	丸森	白石	亶理	仙台	大衡	古川	鹿島台	築館	米山	気仙沼	石巻
出穂期(各地区)	8月2日	8月2日	7月31日	7月31日	7月31日	8月1日	8月1日	8月2日	7月31日	8月5日	7月31日
刈取適期	曜日	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温	積算気温
9月7日	月	862.7	855.5	912.3	935.0	895.8	876.8	871.8	850.8	903.9	771.5
9月8日	火	884.6	877.1	934.4	957.6	917.3	898.4	893.4	872.2	925.6	792.6
9月9日	水	906.3	898.5	956.3	980.1	938.6	919.8	914.8	893.5	947.1	813.6
9月10日	木	927.8	919.7	978.0	1,002.4	959.7	941.0	936.0	914.6	968.4	834.4
9月11日	金	949.1	940.7	999.6	1,024.5	980.6	962.0	957.0	935.5	989.6	855.0
9月12日	土	970.2	961.6	1,021.0	1,046.4	1,001.3	982.8	977.8	956.2	1,010.6	875.5
9月13日	日	991.1	982.3	1,042.2	1,068.1	1,021.8	1,003.4	998.4	976.7	1,031.3	895.8
9月14日	月	1,011.8	1,002.8	1,063.2	1,089.7	1,042.1	1,023.8	1,018.8	997.0	1,051.8	915.9
9月15日	火	1,032.3	1,023.1	1,084.0	1,111.1	1,062.2	1,044.0	1,039.0	1,017.0	1,072.1	935.8
9月16日	水	1,052.6	1,043.1	1,104.6	1,132.3	1,082.0	1,064.0	1,059.0	1,036.8	1,092.2	955.5
9月17日	木	1,072.6	1,062.9	1,125.0	1,153.2	1,101.6	1,083.7	1,078.7	1,056.4	1,112.0	975.0
9月18日	金	1,092.4	1,082.5	1,145.2	1,173.9	1,121.0	1,103.2	1,098.2	1,075.7	1,131.6	994.3
9月19日	土	1,112.0	1,101.9	1,165.2	1,194.4	1,140.1	1,122.5	1,117.4	1,094.8	1,151.0	1,013.3
9月20日	日	1,131.3	1,121.0	1,184.9	1,214.7	1,159.0	1,141.5	1,136.4	1,113.6	1,170.1	1,032.1
9月21日	月	1,150.4	1,139.9	1,204.4	1,234.8	1,177.6	1,160.3	1,155.2	1,132.2	1,189.0	1,050.7
9月22日	火	1,169.3	1,158.6	1,223.7	1,254.7	1,196.0	1,178.9	1,173.7	1,150.5	1,207.6	1,069.1
9月23日	水	1,187.9	1,177.1	1,242.8	1,274.4	1,214.2	1,197.2	1,192.0	1,168.6	1,226.0	1,087.3
9月24日	木	1,206.3	1,195.4	1,261.7	1,293.9	1,232.2	1,215.3	1,210.1	1,186.5	1,244.2	1,105.2
9月25日	金	1,224.5	1,213.5	1,280.5	1,313.2	1,250.0	1,233.2	1,228.0	1,204.1	1,262.2	1,122.9

注1) 「ひとめぼれ」の刈取早限は940℃程度、刈取適期は1,000℃程度、刈取晩限は1,100℃程度とされている。

注2) 気温の積算値は、8月11日までは各アメダス地点の実測値、8月12日以降は平年値を用いた。

- ・品種別の出穂後の積算平均気温（刈取適期の目安）については、下表を参照する。
- ◆各品種の出穂期は、「宮城の稲作指導指針（基本編）」によれば、中生品種の「ひとめぼれ」及び「ササニシキ」の出穂期を8月1日とした場合、概ね「まなむすめ」は1日早く、「だて正夢」は2日、「金のいぶき」は4日、「みやこがねもち」は5日、「つや姫」は9日、それぞれ遅い。

品種名	出穂後の積算平均気温	出穂後の日数
ひとめぼれ	940～1,100℃	40～45日
ササニシキ	930～1,150℃	45～50日
だて正夢	1,020～1,060℃	50日前後
金のいぶき	1,050～1,150℃	50～55日
つや姫	1,000～1,200℃	50～55日
まなむすめ	960～1,050℃	45～50日
みやこがねもち	950～1,150℃	45～50日