

# 令和5年作向け 水稻中後期除草剤のご紹介

クサネム・イボクサ対策！

1成分

**ロイヤント™**  
乳剤  
Rinskor™ active



水稻用除草剤

規格：200ml、1L

## ○草種別葉齢限界

クサネム：70cmまで、イボクサ：60cmまで  
/ビエ：5葉期まで、コナギ：心形葉5葉まで  
オモダカ：矢尻葉3葉まで

○使用時期（移植水稻）※直播にも  
移植後20日～/ビエ5葉期 使用可  
ただし、**収穫45日前まで**

粒剤散布で  
様々な問題雑草に効く！

3成分

**ウィードコア™**  
1キロ粒剤  
Rinskor™ active



水稻用除草剤

規格：1kg

## ○草種別葉齢限界

クサネム：30cmまで、イボクサ：40cmまで  
/ビエ：4葉期まで、オモダカ：30cmまで  
コナギ：心形葉2葉まで

○使用時期（移植水稻）※直播にも  
移植後7日～/ビエ4葉期 使用可  
ただし、**収穫60日前まで**

湛水散布可能な広葉剤！

2成分

**パイスコウ**  
1キロ粒剤



規格：1kg

白化  
させて草を  
枯らす！



オモダカ白化症

## ○草種別葉齢限界

オモダカ：矢尻葉5葉まで、  
クサネム：20cmまで  
イボクサ：20cmまで、コナギ：心形葉3葉まで  
ホタルイ：花茎15cmまで

○使用時期（移植水稻）※直播にも使用可  
移植後14日～60日ただし、**収穫45日前まで**

クログワイ対策！  
雨にも強い！

2成分

**アレイル™ SC**



茎葉はもちろん  
**根**からも作用！

規格：500ml、5L

## ○草種別葉齢限界

クログワイ：50cmまで、/ビエ：5葉期まで  
クサネム：50cmまで、ホタルイ：花茎10cmまで  
オモダカ：矢尻葉3葉まで  
チョウジタテ：草丈40cmまで

○使用時期（移植水稻）※直播にも使用可  
移植後20日～/ビエ5葉期  
**出穂始期15日前まで（収穫45日前まで）**

※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

# 省力的な水稻中後期除草剤のご紹介

## ツイゲキ<sup>®</sup> 豆つぶ 250



3成分



規格：250g、2.5kg

### ○草種別葉齢限界

ホタルイ：花茎10cmまで※、ノビエ：4葉期まで  
クログワイ：30cmまで、オモダカ：矢尻葉4葉まで  
コナギ：6葉期まで、イボクサ：増殖期まで  
※登録上は花茎20cmまでですが、安定した効果の為に10cmまでの使用をおすすめします。



イメージ写真

### ○豆つぶ剤の紹介

- ・自己拡散製剤のため圃場への均一散布が不要！
- ・10aあたり250gと軽量のため散布が楽！
- ・ドローンとの相性も抜群！
- ・水深5～6cmを確保し散布！

### ○使用時期 ※直播にも使用可

移植後14日～ノビエ4葉期ただし、**収穫60日前まで**

## レブラス<sup>®</sup> エアー粒剤



4成分



ドローンによる  
エアー粒剤散布風景

規格：1.2kg (30a用)

### ○エアー粒剤の紹介

- ・ドローン向けに開発した専用粒剤！
- ・拡散性粒剤のため圃場への均一散布が不要！

### ○草種別葉齢限界

ノビエ：4葉期まで、ホタルイ：花茎10cmまで※  
クログワイ：30cmまで、オモダカ：矢尻葉3葉まで  
※登録上は花茎20cmまでですが、安定した効果の為に10cmまでの使用をおすすめします。

### ○使用時期 ※直播にも使用可

移植後14日～ノビエ4葉期ただし、**収穫60日前まで**

## 主要雑草図鑑



タイヌビエ



コナギ



ホタルイ



オモダカ



イボクサ



クサネム

## 新規品目のご紹介

【園芸殺菌剤】べと病・疫病予防に！

日産

ゾーベックエンテクタ<sup>™</sup> SE



### 【水稻中後期除草剤】

ウィードコア<sup>™</sup> ジャンボ SD

ウィードコア<sup>™</sup> 200SD粒剤

Rinskor active

ウィードコアに  
自己拡散製剤が新登場！

(除草作業の省力化が期待できます。)



※農薬の使用前にラベル(登録)を確認のうえ正しくお使いください。

肥料農薬部 肥料農薬推進課  
※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。