

令和7年作向け 水稻中後期除草剤のご紹介

中後期除草剤レブラスから、
葉齢の進んだ雑草への効果を追求した
「レブラスギア」が誕生しました！

レブラス ギア®

1キロ粒剤・ジャンボ・エア一粒剤

ホタルイは**10cm※1→20cmまで**、
クログワイは**30cm※2→50cmまで**、
オモダカは**3葉期※2,3→4葉期まで**に
枯らせるサイズがアップしました！

※1:レブラスにおける推奨使用時期
※2:レブラスの限界葉齢 ※3:矢尻葉



投げ込むだけで
素早く拡散！
幅広い雑草に効く！

クサネム・イボクサ対策に
おすすめの散布剤！

様々な問題雑草に効く！
高スパック剤！

セカンドショット
ジャンボMX

規格:500g、1.5kg



3成分

※草種別葉齢限界

クサネム: 10cmまで、クログワイ: 20cmまで
ノビエ: 3.5葉期まで、コナギ: 心形葉5葉まで
オモダカ: 矢尻葉3葉まで

※使用時期(※移植水稻)

移植後14日～ノビエ3.5葉期ただし、
収穫45日前まで

ロイヤント™
乳剤

Rinskor™ active

規格:200ml、1L



1成分

※草種別葉齢限界

クサネム: 70cmまで、イボクサ: 60cmまで
ノビエ: 5葉期まで、コナギ: 心形葉5葉まで
オモダカ: 矢尻葉3葉まで

※使用時期(※移植水稻)

移植後20日～ノビエ5葉期ただし、
収穫45日前まで

ウィードコア™ ジャンボ SD

ウィードコア™ 200SD粒剤

ウィードコア™
1キロ粒剤

Rinskor™ active 規格: ジャンボ: 200g
SD: 200g、粒剤: 1kg



3成分

※草種別葉齢限界

クサネム: 30cmまで、イボクサ: 40cmまで
ノビエ: 4葉期まで、コナギ: 心形葉2葉まで
オモダカ: 30cmまで

※使用時期(※移植水稻)

移植後7日～ノビエ4葉期ただし、
収穫60日前まで

作業工程に余裕を生み出すレスキュー剤！
落水でも湛水でも、雨が降っても効果を発揮※！
だから、散布のスケジュールが安定する！
しかも、中干時の散布で後発生の雑草も抑える！

茎葉からも、
根からも吸収！



※散布1時間後に雨が降っても、安定した除草効果を発揮します

アレイル[®]SC

早い時期の落水散布で……




落水散布



今生えている雑草だけを枯らす。

●田面が稲に覆われない時期に、●土壌が見えなくなった時期でも、落水散布をすることで後発生を大きくした雑草を枯らせます。3～4週間抑えられます。

雑草を長く抑えられます！



アレイルSC



対照剤A:後発雑草多

【日産化学社内試験】
試験地 栃木県宇都宮市内水田～全面散布開成系～
移植:2023年5月2日
除草体系:初期雨→アレイル or A剤(移植46日後散布)
散布方法:落水散布、ハイクリブーム使用

散布水量:100ℓ/10a
薬剤処理:中干開始時期
雑草調査:散布54日後



500ml
(10a分)



5L
(1ha分)

～大豆栽培におけるアサガオの防除に！～

トレファノサイド[®] 乳剤



体系処理で難防除雑草アサガオの密度を減らします！

トレファノサイド乳剤
土壌混和

播種

クリアターンなど
土壌処理

大豆バサグランなど
茎葉処理

- 播種前土壌混和による防除方法（推奨300ml/10a）
- 土壌混和处理・耕起深度:10cm
- 薬剤散布後、速やかに土壌混和する（2～3時間以内推奨）
- ほ場の状態（散布時）…耕起後あるいは雑草・残渣の無い状態

注意:土壌混和处理の登録は、**粒剤**にはありません



2019年 日産化学株式会社 生物科学研究所 社内試験

処理・混和・播種日:6月5日 調査日:7月8日(処理33日後)

(肥料農薬部 肥料農薬推進課)

※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。