

# R4年作版 新規中後期除草剤のご紹介

クサネム・イボクサ対策！  
1成分

## ロイアント™

乳剤

Rinskor™ active



水稲用除草剤

規格：200ml、1L

### ○草種別葉齢限界

クサネム：50cmまで、イボクサ：50cmまで  
/ピエ：5葉期まで、コナギ：心形葉3葉まで  
オモダカ：矢尻葉3葉まで

### ○使用時期（移植水稲）

移植後20日～/ピエ5葉期  
ただし、**収穫45日前まで** ※直播にも使用可

粒剤散布で  
様々な問題雑草に効く！  
3成分

## ウィードコア™

1キロ粒剤

Rinskor™ active



水稲用除草剤

規格：1kg

### ○草種別葉齢限界

クサネム：30cmまで、イボクサ：40cmまで  
/ピエ：4葉期まで、オモダカ：30cmまで  
コナギ：心形葉2葉まで

### ○使用時期（移植水稲）

移植後7日～/ピエ4葉期  
ただし、**収穫60日前まで** ※直播にも使用可

湛水散布可能な広葉剤！  
2成分

## パイスコフ

1キロ粒剤



白化させて草を枯らす！



クサネム白化症状

規格：1kg

### ○草種別葉齢限界

オモダカ：矢じり葉5葉まで、  
クサネム：20cmまで  
イボクサ：20cmまで、コナギ：心形葉3葉まで  
ホタルイ：花茎15cmまで

### ○使用時期（移植水稲）※直播にも使用可

移植後14日～60日ただし、**収穫45日前まで**

クログワイ対策！  
雨にも強い！  
2成分

## アレイル™ SC



茎葉はもちろん  
根からも作用！

規格：500ml、5L

### ○草種別葉齢限界

クログワイ：50cmまで、/ピエ：5葉期まで  
クサネム：20cmまで、ホタルイ：花茎10cmまで  
オモダカ：矢尻葉3葉まで  
チョウジタテ：草丈40cmまで

### ○使用時期（移植水稲）※直播にも使用可

移植後25日～/ピエ5葉期ただし、  
**収穫45日前まで** ※出穂始期15日前まで

※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。



# 省力化に最適な中後期剤のご紹介

## ツイゲキ<sup>®</sup> 豆つぶ<sup>®</sup>250

### ○豆つぶ剤の紹介

- ・自己拡散製剤のため圃場への均一散布が不要!
- ・10aあたり250gと軽量のため散布が楽!
- ・ドローンとの相性も抜群!



3成分



豆つぶ剤イメージ写真

規格：250g、2.5kg

### ○草種別葉齢限界

ホタルイ：花茎15cmまで、ノビエ：4葉期まで  
クログワイ：30cmまで、オモダカ：矢尻葉4葉まで  
コナギ：6葉期まで、イボクサ：増殖期まで

○使用時期 ※直播にも使用可

移植後20日～ノビエ4葉期ただし、**収穫60日前まで**



畦畔からのひしゃく散布の様子

## レブラス<sup>®</sup> エアー粒剤

4成分


### ○エアー粒剤の紹介

- ・ドローン向けに開発した専用粒剤
- ・拡散性粒剤なので、均一に散布しなくても大丈夫!



エアー粒剤イメージ写真

規格：1.2kg



ドローンによるエアー粒剤の散布風景

### ○草種別葉齢限界

ノビエ：4葉期まで、ホタルイ：花茎10cmまで  
クログワイ：30cmまで、オモダカ：矢尻葉3葉まで

○使用時期

移植後14日～ノビエ4葉期ただし、**収穫60日前まで** ※直播にも使用可

### 主要雑草図鑑



タイヌビエ



コナギ



ホタルイ



オモダカ



イボクサ



クサネム

※農薬の使用前にラベル(登録)を確認のうえ正しくお使いください。

肥料農薬部 肥料農薬推進課  
※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。