

水稲用 **中期ジャンボ** 除草剤


セカンドショット **ジャンボMX**



・ **「中期にジャンボ」でラクラク散布！**

拡散性に優れた新技術ジャンボ製剤(投げ込みタイプ)により、
稲が成長している中期除草の省力化に貢献します。

《従来ジャンボ剤との拡散性比較》



☆ **拡散性能が飛躍的に向上！**



動画をチェック！

・ **取りこぼした雑草を幅広く防除！**

3つの有効成分で、ホタルイ、オモダカ、クログワイといった
難防除雑草に効果を示します。


☆有効成分：アジムスフロロン…0.36% ペノキスラム…0.36% メソトリオン…2.0%

《草種別散布適期》

クログワイ	オモダカ	ホタルイ	クサネム	コナギ	ノビエ
草丈20cmまで	矢じり葉 3葉期まで	草丈5cmまで	草丈10cmまで	5葉期まで	3.5葉期 まで
クログワイ	オモダカ	ホタルイ	クサネム	コナギ	ノビエ

①幅広い「セカンドショットSジャンボMX」の散布時期

- ・移植20日後から収穫45日前までの幅広い時期で使用可能です。
- ・初期剤との体系処理、一発剤での取りこぼし対策等の使用方法が可能です。



※雑草の生育状況を見て、タイミングを逃さないように散布してください。

②適用雑草および使用方法

	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ハラオモダ カ ミズガヤツリ、ウリカワ クロ グワイ オモダカ、ヒルムシロ セリ	移植後 20 日～ ノビエ 3.5 葉期、 ただし、収穫 45 日前 まで	小包装 (パック) 20 個(500g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：アヅムスルフロン・・・1回、ペノキススラム、メソトリオン・・・2回以内

(全農新潟県本部 肥料農薬部 肥料農薬推進課)