

1. 水稲用中期ジャンボ除草剤



・「中期にジャンボ」でラクラク散布！

拡散性に優れた新技術ジャンボ製剤(投げ込みタイプ)により、
稲が成長している中期除草の省力化に貢献します。

《従来ジャンボ剤との拡散性比較》



動画をチェック！

☆拡散性能が飛躍的に向上！

・取りこぼした雑草を幅広く防除！

ホタルイ、オモダカ、クログワイ等の難防除雑草に効果を示します！


☆有効成分：アジメスルフロン・・・0.36% ペノキスラム・・・0.36% メソトリオン・・・2.0%

《草種別散布適期》

クログワイ	オモダカ	ホタルイ	クサネム	コナギ	ノビエ
草丈20cmまで	矢じり葉 3葉期まで	草丈5cmまで	草丈10cmまで	5葉期まで	3.5葉期 まで

①幅広い散布時期

- ・移植14日後から収穫45日前までの幅広い時期で使用可能です。
- ・初期剤との体系処理や一発処理剤の取りこぼし対策等、雑草の生育状況を見てタイミングを逃さないように散布して下さい。



※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

②適用雑草および使用方法

	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ	移植後 14 日～ ノビエ 3.5 葉期、 ただし、収穫 45 日前 まで	小包装 (パック) 20 個(500g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 4 葉期～ノビエ 4 葉期、 ただし収穫 45 日前 まで	小包装 (パック) 20 個(500g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：アジムスルフロン・・・1回、ペノキスラム、メソトリオン・・・2回以内

2. 水稲用中・後期除草剤



待望の
ジャンボ剤
新登場!!

【5月下旬発売予定】

◆4つの優れた除草成分を合理的に配合。

ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカ等の問題雑草を難なく一掃。

☆有効成分：ジメタメトリン・・・2.5% ダイムロン・・・25.0% テフリルトリオン・・・7.5% メタゾスルフロン・・・3.0%

◆「テフリルトリオン」「ジメタメトリン」が相乗的に作用し、ホタルイやコナギをより確実に枯らします。

【適用雑草および使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ	移植後 14 日～ ノビエ 4 葉期 ただし、収穫 60 日 前まで	ジャンボ 小包装(パック) 10 個(400g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：ジメタメトリン、テフリルトリオン、メタゾスルフロン・・・2回以内

ダイムロン・・・3回以内 (育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)

(肥料農薬部 肥料農薬推進課)

※ 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。