

すばやく効いて、害虫から大切な作物を守る。

JAだけの
ジェネリック農薬

園芸用
殺虫剤

ジエイエース

®は全農の登録商標です。

害虫退治を無事終えて

ご一行様
ご到着!



水溶剤

農林水産省登録
第20967号

有効成分：
アセフェート 50.0%



製造：JA全農

粒剤

農林水産省登録
第20939号

有効成分：
アセフェート 5.0%



水溶剤

ジエース登録内容

平成30年9月現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かき	カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1500倍	200～700 ℓ/10a	収穫45日前まで	2回以内		2回以内
いちじく	アザミウマ類	2000倍		収穫45日前まで			1回
キャベツ	ハスモンヨトウ、アオムシ、コナガ ヨトウムシ、アブラムシ類 タマナギンウワバ	1000～1500倍		収穫30日前まで	1回		2回以内(定植時までの 処理は1回以内、定植後の 散布は1回以内)
はくさい	ハスモンヨトウ、アオムシ、コナガ ヨトウムシ、アブラムシ類	1500倍		収穫30日前まで			1回
レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍					
非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍			3回以内		3回以内
カリフラワー	ヨトウムシ	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫14日前まで			
チンゲンサイ	アブラムシ類	1500倍		収穫21日前まで	1回	散布	1回
みずな	アブラムシ類、フタテンミドリヒメコバイ			収穫開始7日前まで			
オクラ	アブラムシ類			収穫30日前まで			
ほうれんそう	アブラムシ類			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000倍		収穫45日前まで	1回		1回
やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ						
ばれいしょ	ヨトウムシ オオニジウヤホシテントウ アブラムシ類	1000～2000倍 300倍	25ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内		3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500倍	100～300 ℓ/10a	収穫21日前まで	5回以内		5回以内
てんさい	ヨトウムシ テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	1000倍 60～100倍	100～300 ℓ/10a ペーパーポット 1冊当り1ℓ (3ℓ/m ²)	収穫45日前まで 育苗期	3回以内 1回	3回以内 灌注	4回以内 (育苗期の灌注は 1回以内、 散布は3回以内)
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバイ チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍 1000～1500倍	200～400 ℓ/10a	摘採45日前まで	1回		1回
だいず	アブラムシ類、ハスモンヨトウ			収穫60日前まで	3回以内		3回以内
ごぼう	アブラムシ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫45日前まで	1回		2回以内(株元散布は1回 以内、散布は1回以内)
あずき	ノメイガ類、アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
いんげんまめ	アブラムシ類						
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ、アブラムシ類	1500～2500倍	25～180 ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
つつじ類	ツツジグンバイ	1500倍					
つばき類	チャドクガ		200～700 ℓ/10a				
さくら	アメリカシロヒトリ モンクローシャチホコ	1500～2000倍					
ばら	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～1500倍 1000倍	100～300 ℓ/10a	発生初期	5回以内		5回以内
きく	アブラムシ類、アザミウマ類 マメハモグリバエ、オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)	アブラムシ類、アザミウマ類	1000倍	100～300 ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ タマナヤガ シバオサザウムシ成虫		0.3ℓ/m ² 0.3～0.5ℓ/m ² 0.3～1ℓ/m ²				

粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
はくさい	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)			株元散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (2g/株)			作条散布	
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		株元散布	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫21日前まで		株元散布	
なばな	アブラムシ類	6kg/10a (2g/株)			土壌混和処理	1回
きゅうり	オンシツコナジラミ、アブラムシ類 アザミウマ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		作条散布 又は植穴処理	
トマト	アブラムシ類、オンシツコナジラミ					
なす	アブラムシ類、オンシツコナジラミ アザミウマ類					
ごぼう	アブラムシ類	3～6kg/10a	収穫75日前まで		株元散布	2回以内(株元散布は 1回以内、散布は1回以内)
みずな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時		作条散布後 土壌混和	1回
ばれいしょ	アブラムシ類		植付時		作条散布	3回以内(植付時の処理は 1回以内、植付後は2回以内)
こまつな		3～6kg/10a	は種前		作条散布後 土壌混和	1回
チンゲンサイ			定植時		作条散布後 土壌混和	1回
たばこ	ヨトウムシ、アブラムシ類		移植前		作条散布後 土壌混和	2回以内
花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)	アブラムシ類 アザミウマ類	1～2g/株(但し、 9kg/10aまで) 2g/株(但し、 9kg/10aまで)			株元散布	5回以内
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、 マメハモグリバエ	6～9kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
トルコギキョウ	アブラムシ類、アザミウマ類	1～2g/株(但し、 9kg/10aまで)				
つつじ類	ツツジグンバイ	2g/株				
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ タマナヤガ	10kg/10a 5～10kg/10a			全面散布	

1. 使用前にラベルをよく読んでください。
2. ラベルの記載以外には使用しないでください。
3. 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
4. 使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。