

Ⅱ 作物別施肥例

施肥例の利用にあたって

- (1) 施肥量は県で作成した施肥基準に従っているが、銘柄によっては必ずしも一致しない。
また、基肥 * 追肥の他、追肥成分を含有した一発肥料の銘柄等、数種類の肥料銘柄を例示した。
- (2) それぞれの作物に対する改良 pH を示し、矯正する石灰質資材の施用量としては、作付前の pH を測定して決める。苦土炭カルによる酸性矯正の目安量は下記の通りとなる。

酸性矯正に必要な苦土炭カル目安量(kg/10a 深さ 15cm)

土壌区分	改良 pH	5.0	5.5	6.0	6.5
	現在 pH				
黒ボク土	4.5	100～120	200～240	300～360	400～480
	5.0				
	5.5				
	6.0				
灰色低地土	4.5	80～100	160～200	240～300	320～400
	5.0				
	5.5				
	6.0				

注)深さに応じて目安量も加減する。

- (3) 記号について

表の中の作型模式図の記号は次のとおりとする。

○ 播 種

..... 苗代又は苗床期間

— 生育期間

× 定 植

□ 収穫期間

∩ トネル

マ マ ル チ

♡ 萌 芽 期

~~~~ 休 眠 期

⊗ ⊗ 一 斉 刈

⌢ ハ ウ ス

△ ピ ン チ

山 高冷地山上げ

⊖ 基 肥

⊕ 中間追肥

⊖ 穂 肥

①②③④ は追肥回数と時期を示す。

- (4) 基肥一発肥料に配合してある被覆窒素の主な溶出期間(20～80%溶出)を ←→ で表し、穂肥又は追肥の欄にその成分量を記載した。

- (5) 作型模式図の読み方について

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ア. ○-----□

..... 作期の幅を示す。

イ. ○-----○ ×-----×

○-----○ 播種期の幅


×-----× 定植期の幅

□ 収穫期の幅を示す。

- (6) その他

- ①保証成分の欄の含は含有成分を示す。
- ②施設栽培には土壌診断結果による施肥例を示した。
- ③低PKは、窒素成分・被覆窒素の配合割合は同じで、りん酸と加里を低成分にした低コスト肥料。  
連年施用する場合は、数年に一度 土壌診断を実施し、土壌の肥沃状況を確認する必要がある。

## 水稻栽培の地域区分図



( )内は、旧市町村名

# 水 稲・陸 稻・麦 類

## 1 水 稻

### (1) 北部（山間）地域

堆きゅう肥 500～1,000 kg、 ケイカル 100 kg、可給態りん酸が少ない場合(10mg/100g 以下) ようりん 80～120 kg

けい酸とりん酸と加里の補給には、地力アップ PSK40～80 kg

| 栽 培 型 | 品 種 名 | 栽植様式                        | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-----------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                             | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 早 植   | コシヒカリ | m <sup>2</sup> 当り<br>20～22株 |           |    |    | ○  | ×  | ⊕  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | なすひかり | 〃                           |           |    |    | ○  | ×  | ⊕  | ⊕  |    | □  |     |     |     |

#### 早植 コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 3～4 | — | 12  | — | 9   |
| (穂肥)     | 3程度 | — | 0   | — | 3程度 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                              |                 |                        |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                  | 基肥 kg/10a       | 穂肥 kg/10a              |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア S タイプ〔6(4)-16-16-Mg2-Si10〕<br>又は<br>BB プレミアライト〔5(2.5)-14-14-Mg3-Si11〕 | 80～90<br>90～100 | (3.2～3.6)<br>(2.2～2.5) |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくんSタイプ〔12(8)-20-22〕                                                    | 40～50           | (3.2～4.0)              |
|                  | けい酸入基肥<br>*<br>追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕                                              | 80～100          |                        |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                                                        |                 | 15～20(1.5～2.0)         |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB 850号〔8-25-20〕                                                              | 40～50           |                        |
|                  |                   | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕                                                         |                 | 中間追肥 10                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                                                        |                 | 15～20(1.5～2.0)         |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕                                              | 45～55           | (3.0～3.6)              |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕                                                 | 25～30           | (3.2～3.9)              |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー1号〔10(4)-20-16-Mg2〕                                                  | 30～40           | (1.2～1.6)              |
|                  |                   | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕                                                         |                 | 中間追肥 10                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                                                        |                 | 15～20(1.5～2.0)         |
|                  |                   |                                                                               |                 |                        |

# 早植 なすひかり

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 4～5 | － | 15  | － | 8   |
| (穂肥)     | 3程度 | － | 0   | － | 3程度 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                |
|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg／10a | 穂肥 kg／10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 45～50     | (3.6～4.0)      |
|                  | けい酸入基肥<br>＊<br>追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕 | 100～120   |                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
|                  | 基肥<br>＊<br>緩効追肥   | BB 850号〔8-25-20〕                 | 50～60     |                |
|                  |                   | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕            |           | 中間追肥 10        |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 55～65     | (3.6～4.3)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 30～35     | (3.9～4.55)     |
|                  | 基肥<br>＊<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕     | 30～40     | (1.8～2.4)      |
|                  |                   | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕            |           | 中間追肥 10        |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 10～15(1.0～1.5) |

## (2) 北部地域

堆きゅう肥 500～1,000 kg、 ケイカル 100 kg、可給態りん酸が少ない場合(10mg/100g 以下) ようりん 80～120 kg

けい酸とりん酸と加里の補給には、地力アップ PSK40～80 kg

| 栽培型 | 品種名   | 栽植様式                        | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |
|-----|-------|-----------------------------|-----------|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|
|     |       |                             | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 早植  | コシヒカリ | m <sup>2</sup> 当り<br>20～22株 |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕ ⊕ |    | □  |     |     |     |
|     | なすひかり | "                           |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕ ⊕ |    | □  |     |     |     |
|     | とちぎの星 | "                           |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕   |    | □  |     |     |     |

### 早植 コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 3～4 | — | 12  | — | 9   |
| (穂肥)     | 3程度 | — | 0   | — | 3程度 |

| 施 肥 例 |                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                      |                 |                                        |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       |                     | 肥 料 名 [保証成分%]                                                                         | 基肥 kg/10a       | 穂肥 kg/10a                              |
| 全層施肥  | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア 1 号 [6(4)-16-16-Mg2-Si10] 又は<br>BB プレミアライト [5(2.5)-14-14-Mg3-Si11]            | 80～90<br>90～100 | (3.2～3.6)<br>(2.2～2.5)                 |
|       | 同 低 PK              | BB プレミア 100 号 [10(6.6)-10-10-Mg2-Si11]                                                | 50～60           | (3.3～3.96)                             |
|       | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん 1 号 [12(8)-20-22]                                                           | 40～50           | (3.2～4.0)                              |
|       | 同 低 PK              | BB ひとふりくん 100 号 [12(8)-14-12-Mg2]                                                     | 40～50           | (3.2～4.0)                              |
|       | けい酸入基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド 4 号 [4-18-15-Mg2-含 Si9]<br>BBNK-205 号 [20(10)-0-15]                       | 80～100          | 15～20(1.5～2.0)                         |
|       | 基肥<br>*<br>緩効追肥     | BB 850 号 [8-25-20]<br>BBekシリカ [K46-Mg1-Si11]<br>BBNK-205 号 [20(10)-0-15]              | 40～50           | 中間追肥 10<br>15～20(1.5～2.0)              |
|       |                     |                                                                                       |                 |                                        |
| 側条施肥  | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア側条レッド [10(6.6)-18-14-Si16]                                                     | 45～60           | (3.0～3.9)                              |
|       | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん側条 086 [20(13.3)-18-16]                                                      | 25～30           | (3.3～4.0)                              |
|       | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー 1 号 [10(4)-20-16-Mg2]<br>BBekシリカ [K46-Mg1-Si11]<br>BBNK-205 号 [20(10)-0-15] | 30～40           | (1.2～1.6)<br>中間追肥 10<br>15～20(1.5～2.0) |
|       |                     |                                                                                       |                 |                                        |
|       |                     |                                                                                       |                 |                                        |

# 早植 なすひかり

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 4～5 | － | 15  | － | 8   |
| (穂肥)     | 3程度 | － | 0   | － | 3程度 |

| 施 肥 例 |                      | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                |
|-------|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|       |                      | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全層施肥  | けい酸入り<br>基肥一発肥料      | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|       | 基肥一発肥料               | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 45～50     | (3.6～4.0)      |
|       | けい酸入り基肥<br>＊<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕 | 100～120   |                |
|       |                      | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
|       | 基肥<br>＊<br>緩効追肥      | BB 850号〔8-25-20〕                 | 50～60     |                |
|       |                      | BBekシリカ〔K46-Mg1-Si11〕            |           | 中間追肥 10        |
|       |                      | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
| 側条施肥  | けい酸入り<br>基肥一発肥料      | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 55～65     | (3.6～4.3)      |
|       | 基肥一発肥料               | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 30～35     | (3.9～4.55)     |
|       | 緩効基肥<br>＊<br>緩効追肥    | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕     | 30～40     | (1.8～2.4)      |
|       |                      | BBekシリカ〔K46-Mg1-Si11〕            |           | 中間追肥 10        |
|       |                      | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
|       |                      |                                  |           |                |

# 早植 とちぎの星

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 4～5 | － | 15  | － | 9   |
| (穂肥)     | 2～3 | － | 0   | － | 2～3 |

| 施 肥 例 |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                         |           |                |
|-------|-------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|
|       |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                             | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全層施肥  | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB とちぎの星専用プレミア<br>〔12(6)-12-12-Mg1-Si16〕 | 45～60     | (2.7～3.6)      |
|       | 基肥一発肥料            | BB とちぎの星専用ひとふりくん〔12(4.8)-12-12〕          | 45～60     | (2.16～2.88)    |
|       | 基肥<br>＊<br>緩効追肥   | BB286号〔12-18-16〕                         | 35～40     |                |
|       |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 10～15(1.0～1.5) |
| 側条施肥  | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条レッド〔10(6.6)-18-14-Si16〕         | 60～70     | (4.0～4.6)      |
|       | 基肥一発肥料            | BB 側条とちぎの星専用ひとふりくん<br>〔24(12)-12-12〕     | 25～30     | (3.0～3.6)      |
|       | 緩効基肥<br>＊<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕             | 35～45     | (1.8～2.7)      |
|       |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 10～15(1.0～1.5) |

### (3)中部地域

堆きゅう肥 500～1,000 kg、 ケイカル 80 kg、可給態りん酸が少ない場合(10mg/100g 以下) ようりん 80～120 kg

けい酸とりん酸と加里の補給には、地力アップ PSK40～80 kg

| 栽培型   | 品種名   | 栽植様式                        | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-----------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                             | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 早 植   | コシヒカリ | m <sup>2</sup> 当り<br>20～22株 |           |    |    | ○  | ×  | ⊕  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | なすひかり | 〃                           |           |    |    | ○  | ×  | ⊕  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | あさひの夢 | 〃                           |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | とちぎの星 | 〃                           |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕  |    | □  |     |     |     |
| 普 通 植 | コシヒカリ | 20～22株                      |           |    |    |    | ○  | ×  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | あさひの夢 | 22～24株                      |           |    |    |    | ○  | ×  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | とちぎの星 | 〃                           |           |    |    |    | ○  | ×  | ⊕  |    | □  |     |     |     |

# 早植 コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 2～3 | － | 12  | － | 6   |
| (穂肥)     | 3程度 | － | 0   | － | 3程度 |

| 施 肥 例            |                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                              |                         |                                       |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                  |                     | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                                  | 基肥 kg/10a               | 穂肥 kg/10a                             |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア1号〔6(4)－16－16－Mg2－Si10〕 又は<br>BB プレミア2号〔5(3.7)－14－14－Mg3－Si10〕 又は<br>BB プレミアライト〔5(2.5)－14－14－Mg3－Si11〕 | 70～80<br>80～90<br>80～95 | (2.8～3.2)<br>(2.96～3.33)<br>(2.0～2.4) |
|                  | 同 低 PK              | BB プレミア100号〔10(6.6)－10－10－Mg2－Si11〕<br>又は<br>BB プレミア200号〔10(7.5)－10－10－Mg2－Si11〕                              | 40～50<br>40～50          | (2.64～3.3)<br>(3.0～3.75)              |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん1号〔12(8)－20－22〕 又は<br>BB ひとふりくん2号〔10(7.5)－18－20－Mg1〕                                                 | 35～45<br>40～50          | (2.8～3.6)<br>(3.0～3.75)               |
|                  | 同 低 PK              | BB ひとふりくん100号〔12(8)－14－12－Mg2〕又は<br>BB ひとふりくん200号〔10(7.5)－12－12－Mg3〕                                          | 35～45<br>40～50          | (2.8～3.6)<br>(3.0～3.75)               |
|                  | けい酸入基肥<br>＊<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4－18－15－Mg2－含 Si9〕                                                                              | 60～80                   |                                       |
|                  |                     | BBNK－205号〔20(10)－0－15〕                                                                                        |                         | 15～20(1.5～2.0)                        |
|                  | 基肥<br>＊<br>緩効追肥     | BB 850号〔8－25－20〕                                                                                              | 30～40                   |                                       |
|                  |                     | BBeKシリカ〔K46－Mg1－Si11〕                                                                                         |                         | 中間追肥 10                               |
|                  |                     | BBNK－205号〔20(10)－0－15〕                                                                                        |                         | 15～20(1.5～2.0)                        |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア側条レッド〔10(6.6)－18－14－Si16〕                                                                              | 45～60                   | (2.9～3.9)                             |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん側条086〔20(13.3)－18－16〕                                                                                | 20～25                   | (2.6～3.3)                             |
|                  | 緩効基肥<br>＊<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー1号〔10(4)－20－16－Mg2〕                                                                                  | 20～30                   | (0.8～1.2)                             |
|                  |                     | BBeKシリカ〔K46－Mg1－Si11〕                                                                                         |                         | 中間追肥 10                               |
|                  |                     | BBNK－205号〔20(10)－0－15〕                                                                                        |                         | 15～20(1.5～2.0)                        |

# 早植 なすひかり

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 4～5 | － | 12  | － | 6   |
| (穂肥)     | 3程度 | － | 0   | － | 3程度 |

| 施 肥 例            |                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                |
|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                     | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg／10a | 穂肥 kg／10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 40～50     | (3.2～4.0)      |
|                  | けい酸入基肥<br>＊<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕 | 100～120   |                |
|                  |                     | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
|                  | 基肥<br>＊<br>緩効追肥     | BB 850号〔8-25-20〕                 | 50～60     |                |
|                  |                     | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕            |           | 中間追肥 10        |
|                  |                     | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 55～65     | (3.6～4.3)      |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 30～35     | (3.9～4.5)      |
|                  | 緩効基肥<br>＊<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕     | 30～40     | (1.8～2.4)      |
|                  |                     | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕            |           | 中間追肥 10        |
|                  |                     | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕           |           | 15～20(1.5～2.0) |

### 早植 あさひの夢

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 5～6 | — | 15  | — | 9   |
| (穂肥)     | 3～4 | — | 0   | — | 3～4 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                |           |                |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                    | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア4号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕 | 70～80     | (3.5～4.0)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん222〔12(5)-12-12-Mg4〕   | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|                  | 鉄入基肥<br>*<br>緩効追肥 | BBF284号〔12-18-14〕               | 40～50     |                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕          |           | 15～20(1.5～2.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条055〔20(11.7)-15-15〕  | 35～40     | (4.1～4.7)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕    | 40～50     | (2.4～3.0)      |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕          |           | 15～20(1.5～2.0) |

### 早植 とちぎの星

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 4～5 | — | 15  | — | 9   |
| (穂肥)     | 2～3 | — | 0   | — | 2～3 |

| 施 肥 例            |                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                         |           |                |
|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                     | 肥 料 名〔保証成分%〕                             | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB とちぎの星専用プレミア<br>〔12(6)-12-12-Mg1-Si16〕 | 45～60     | (2.7～3.6)      |
|                  | 基肥一発肥料              | BB とちぎの星専用ひとふりくん〔12(4.8)-12-12〕          | 45～60     | (2.1～2.9)      |
|                  | けい酸入基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕         | 100～120   |                |
|                  |                     | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 15～20(1.5～2.0) |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥     | BB286号〔12-18-16〕                         | 35～40     |                |
|                  |                     | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 15～20(1.5～2.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア側条レッド〔10(6.6)-18-14-Si16〕         | 60～70     | (4.0～4.6)      |
|                  | 基肥一発肥料              | BB 側条とちぎの星専用ひとふりくん<br>〔24(12)-12-12〕     | 25～30     | (3.0～3.6)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕             | 35～45     | (2.6～2.7)      |
|                  |                     | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 10～15(1.0～1.5) |

普通植 コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 1～2 | — | 12  | — | 6   |
| (穂肥)     | 1～2 | — | 0   | — | 1～2 |

| 施 肥 例            |                      | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |               |
|------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
|                  |                      | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a     |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料      | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 20～30     | (1.0～1.5)     |
|                  | 基肥一発肥料               | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 15～20     | (1.2～1.6)     |
|                  | けい酸入り基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕 | 40～60     |               |
|                  |                      | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 5～10(0.5～1.0) |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥      | BB 850号〔8-25-20〕                 | 15～25     |               |
|                  |                      | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 5～10(0.5～1.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料      | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 20～30     | (1.3～2.0)     |
|                  | 基肥一発肥料               | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 10～15     | (1.3～1.9)     |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥    | BB 側条スーパー1号〔10(4)-20-16-Mg2〕     | 15～25     | (0.6～1.0)     |
|                  |                      | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 5～10(0.5～1.0) |

普通植 あさひの夢

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 5～6 | — | 10  | — | 7   |
| (穂肥)     | 2～3 | — | 0   | — | 2～3 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                |
|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 40～50     | (3.2～4.0)      |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB-286号〔12-18-16〕                | 40～50     |                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 10～15(1.0～1.5) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 50～60     | (3.3～3.9)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 30～35     | (3.9～4.5)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕     | 40～50     | (2.4～3.0)      |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 10～15(1.0～1.5) |

普通植 とちぎの星

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 3   | － | 10  | － | 7   |
| (穂肥)     | 2～3 | － | 0   | － | 2～3 |

| 施 肥 例            |                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                    |
|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
|                  |                 | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a          |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料 | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 40～60     | (2.0～3.0)          |
|                  | 基肥一発肥料          | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 30～40     | (2.4～3.2)          |
|                  | 基肥<br>＊<br>緩効追肥 | BB－286号〔12-18-16〕                | 20～30     |                    |
|                  |                 | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕           |           | 10～15(1.0～1.5)     |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料 | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 35～45     | ( <b>2.3</b> ～3.0) |
|                  | 基肥一発肥料          | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 20～25     | (2.6～3.2)          |
|                  | 基肥<br>＊<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕     | 20～30     | (1.2～1.8)          |
|                  |                 | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕           |           | 10～15(1.0～1.5)     |

#### (4) 南部（沖積）地域

堆きゅう肥 500～1,000 kg、 ケイカル 160 kg、可給態りん酸が少ない場合(10mg/100g 以下) ようりん 80～120 kg  
けい酸とりん酸と加里の補給には、地力アップ PSK40～80 kg

| 栽培型   | 品種名   | 栽植様式                        | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-----------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                             | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 早 植   | コシヒカリ | m <sup>2</sup> 当り<br>20～22株 |           |    |    | ○  | ×  | ⊕  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | あさひの夢 | 〃                           |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | とちぎの星 | 〃                           |           |    |    | ○  | ×  |    | ⊕  |    | □  |     |     |     |
| 普 通 植 | コシヒカリ | 20～22株                      |           |    |    |    | ○  | ×  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | あさひの夢 | 22～24株                      |           |    |    |    | ○  | ×  | ⊕  |    | □  |     |     |     |
|       | とちぎの星 | 〃                           |           |    |    |    | ○  | ×  | ⊕  |    | □  |     |     |     |

# 早植 コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 2   | － | 9   | － | 6   |
| (穂肥)     | 2～3 | － | 0   | － | 2～3 |

| 施 肥 例            |                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                |           |                                        |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|                  |                     | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                    | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a                              |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア2号〔5(3.7)-14-14-Mg3-Si10〕<br>又は<br>BB プレミアライト〔5(2.5)-14-14-Mg3-Si11〕     | 70～80     | (2.6～3.0)                              |
|                  | 同 低 PK              | BB プレミア200号〔10(7.5)-10-10-Mg2-Si11〕                                             | 35～40     | (2.6～3.0)                              |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん2号〔10(7.5)-18-20-Mg1〕<br>又は<br>BB ひとふりくん3号〔10(8)-15-15-Mg4〕            | 35～40     | (2.6～3.0)                              |
|                  | 同 低 PK              | BB ひとふりくん200号〔10(7.5)-12-12-Mg3〕                                                | 35～40     | (2.6～3.0)                              |
|                  | けい酸入基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕<br>BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                      | 40～60     | 10～15(1.0～1.5)                         |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥     | BB 850号〔8-25-20〕<br>BBekシリカ〔K46-Mg1-Si11〕<br>BBNK-205号〔20(10)-0-15〕             | 20～30     | 中間追肥 10<br>10～15(1.0～1.5)              |
|                  | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア側条レッド〔10(6.6)-18-14-Si16〕                                                | 35～45     | (2.3～3.0)                              |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん側条086〔20(13.3)-18-16〕                                                  | 15～20     | (2.0～2.6)                              |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー1号〔10(4)-20-16-Mg2〕<br>BBekシリカ〔K46-Mg1-Si11〕<br>BBNK-205号〔20(10)-0-15〕 | 15～25     | (0.6～1.0)<br>中間追肥 10<br>10～15(1.0～1.5) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 |                     |                                                                                 |           |                                        |

### 早植 あさひの夢

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 5～6 | — | 10  | — | 8   |
| (穂肥)     | 3～4 | — | 0   | — | 3～4 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                |           |                |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                    | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア4号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕 | 70～80     | (3.5～4.0)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん222〔12(5)-12-12-Mg4〕   | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|                  | 鉄入基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB-F284号〔12-18-14〕              | 40～50     |                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕          |           | 15～20(1.5～2.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条055〔20(11.7)-15-15〕  | 35～40     | (4.1～4.7)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕    | 40～50     | (2.4～3.0)      |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕          |           | 15～20(1.5～2.0) |

### 早植 とちぎの星

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 4～5 | — | 10  | — | 8   |
| (穂肥)     | 2～3 | — | 0   | — | 2～3 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                         |           |                |
|------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                             | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB とちぎの星専用プレミア<br>〔12(6)-12-12-Mg1-Si16〕 | 45～60     | (2.7～3.6)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB とちぎの星専用ひとふりくん〔12(4.8)-12-12〕          | 45～60     | (2.1～2.9)      |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB 286号〔12-18-16〕                        | 35～40     |                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 10～15(1.0～1.5) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条レッド〔10(6.6)-18-14-Si16〕         | 60～70     | (4.0～4.6)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB 側条とちぎの星専用ひとふりくん<br>〔24(12)-12-12〕     | 25～30     | (3.0～3.6)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕             | 35～45     | (2.1～2.7)      |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                   |           | 10～15(1.0～1.5) |

普通植 コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 2   | — | 7   | — | 5   |
| (穂肥)     | 1～2 | — | 0   | — | 1～2 |

| 施 肥 例            |                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |               |
|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
|                  |                     | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a     |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア5号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕  | 20～30     | (1～1.5)       |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕    | 15～20     | (1.2～1.6)     |
|                  | けい酸入基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB スーパーブレンド4号〔4-18-15-Mg2-含 Si9〕 | 40～60     |               |
|                  |                     | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 5～10(0.5～1.0) |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥     | BB 850号〔8-25-20〕                 | 20～30     |               |
|                  |                     | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 5～10(0.5～1.0) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料     | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕 | 20～30     | (1.3～2.0)     |
|                  | 基肥一発肥料              | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕    | 10～15     | (1.3～1.9)     |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB 側条スーパー1号〔10(4)-20-16-Mg2〕     | 15～25     | (0.6～1.0)     |
|                  |                     | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕           |           | 5～10(0.5～1.0) |

普通植 あさひの夢

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 5～6 | — | 8   | — | 7   |
| (穂肥)     | 2～3 | — | 0   | — | 2～3 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                  |           |                |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                      | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア 5 号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕 | 60～70     | (3.0～3.5)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕     | 40～50     | (3.2～4.0)      |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB-286号〔12-18-16〕                 | 40～50     |                |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕            |           | 10～15(1.0～1.5) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕  | 50～60     | (3.3～3.9)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕     | 30～35     | (3.9～4.5)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕      | 40～50     | (2.4～3.0)      |
|                  |                   | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕            |           | 10～15(1.0～1.5) |

普通植 とちぎの星

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 3   | － | 8   | － | 7   |
| (穂肥)     | 2～3 | － | 0   | － | 2～3 |

| 施 肥 例            |                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                  |           |                |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
|                  |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                      | 基肥 kg／10a | 穂肥 kg／10a      |
| 全<br>層<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア 5 号〔10(5)-10-10-Mg2-Si11〕 | 40～60     | (2.0～3.0)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん464〔14(8)-16-14-Mg1〕     | 30～40     | (2.4～3.2)      |
|                  | 基肥<br>*<br>緩効追肥   | BB－286号〔12-18-16〕                 | 20～30     |                |
|                  |                   | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕            |           | 10～15(1.0～1.5) |
| 側<br>条<br>施<br>肥 | けい酸入り<br>基肥一発肥料   | BB プレミア側条ブルー〔10(6.6)-18-14-Si16〕  | 35～45     | (2.3～3.0)      |
|                  | 基肥一発肥料            | BB ひとふりくん側条Sタイプ〔20(13)-14-14〕     | 20～25     | (2.6～3.2)      |
|                  | 緩効基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 側条スーパー2号〔12(6)-18-16-Mg2〕      | 20～30     | (1.2～1.8)      |
|                  |                   | BBNK－205号〔20(10)-0-15〕            |           | 10～15(1.0～1.5) |

(5) 直播栽培 (湛水直播)

| 対象地域 | 品 種 名 | 栽植様式       | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |       |            | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中・北部 | コシヒカリ | 条播又は<br>点播 |           |    |    |    | ○  |    | ⊕  | ⊖  |    | □   |     |     |
| 中・北部 | なすひかり | 〃          |           |    |    |    | ○  |    | ⊖  |    |    | □   |     |     |
| 中・南部 | あさひの夢 | 〃          |           |    |    |    | ○  |    |    | ⊖  |    | □   |     |     |

コシヒカリ

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 1~2 | — | 12  | — | 6   |
| (穂肥)     | 1~2 | — | 0   | — | 1~2 |

| 施 肥 例     |                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                   |                |                        |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|           |                 | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                       | 基肥 kg/10a      | 穂肥 kg/10a              |
| 全層<br>施肥  | 基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB 850号〔8-25-20〕                                                   | 15～25          |                        |
|           |                 | BBeKシリカ〔K46-Mg1-Si11〕                                              |                | 中間追肥 10                |
|           |                 | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                                             |                | 5～10(0.5～1.0)          |
| 全層・<br>側条 | 基肥一発肥料          | BB ひとふりくん直播F1〔20(18)-12-12-Mg1〕<br>又は<br>BB 直播一発 新時代〔24(22)-12-12〕 | 20～25<br>20～25 | (3.6～4.5)<br>(4.4～5.5) |

注 基肥一発肥料は早植栽培(稚苗)に沿った施肥量、乾田直播は1～2割増やす。

なすひかり

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | — | りん酸 | — | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 3~4 | — | 12  | — | 6   |
| (穂肥)     | 2~3 | — | 0   | — | 2~3 |

| 施 肥 例     |                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                               |                |                        |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|           |                 | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                   | 基肥 kg/10a      | 穂肥 kg/10a              |
| 全層<br>施肥  | 基肥<br>*<br>緩効追肥 | BB-286号〔12-18-16〕                                              | 25～35          |                        |
|           |                 | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                                         |                | 10～15(1.0～1.5)         |
| 全層・<br>側条 | 基肥一発肥料          | BB ひとふりくん直播F1〔20(18)-12-12-Mg1〕又は<br>BB 直播一発 新時代〔24(22)-12-12〕 | 25～30<br>25～30 | (4.5～5.4)<br>(5.5～6.6) |

注 基肥一発肥料は早植栽培(稚苗)に沿った施肥量、乾田直播は1～2割増やす。

# あさひの夢

|          |     |   |     |   |     |
|----------|-----|---|-----|---|-----|
|          | 窒素  | － | りん酸 | － | 加里  |
| 施肥基準(基肥) | 3～4 | － | 10  | － | 8   |
| (穂肥)     | 2～3 | － | 0   | － | 2～3 |

| 施 肥 例 |                  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                               |                |                |
|-------|------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
|       |                  | 肥 料 名〔保証成分%〕                                   | 基肥 kg/10a      | 穂肥 kg/10a      |
| 全層施肥  | 基肥又は鉄入基肥<br>* 追肥 | BB オール13〔13-13-13-Mg1〕又は<br>BB-F284号〔12-18-14〕 | 25～35<br>25～35 |                |
|       |                  | BBNK-205号〔20(10)-0-15〕                         |                | 10～15(1.0～1.5) |
| 全層・側条 | 基肥一発肥料           | BB ひとふりくん直播F2〔20(18)-12-12-Mg1〕<br>又は          | 35～40          | (6.3～7.2)      |
|       |                  | BB 直播一発 新時代〔24(22)-12-12〕                      | 35～45          | (7.7～9.9)      |

注 基肥一発肥料は早植栽培(稚苗)に沿った施肥量、乾田直播は1～2割増やす。

## (6) 稲の特別栽培農産物

特別栽培農産物:早植え(～5月20日)は慣行N6kg/10aに対し 化学肥料からのNは5割減の3kg/10aまで。

| 品 種   | 施 肥 例          | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                    |           |           |
|-------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|       |                | 肥 料 名〔保証成分%〕                        | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a |
| コシヒカリ | 有機肥料基肥<br>* 追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                 | 県北 35～55  | 30～40     |
|       |                |                                     | 県中 25～40  | 30～40     |
|       |                |                                     | 県南 20～30  | 30～40     |
|       | 基肥一発肥料         | BB 有機配合ひとふりくん<br>〔8(有機4+被覆尿素4)-8-8〕 | 県北 45～65  | (1.8～2.4) |
|       |                |                                     | 県中 35～55  | (1.5～2.1) |
|       |                |                                     | 県南 35～45  | (1.5～1.8) |
| なすひかり | 基肥一発肥料         | BB 有機配合ひとふりくん<br>〔8(有機4+被覆尿素4)-8-8〕 | 県内 35～55  | (1.5～2.1) |

## (7) 飼料用米、米粉用米

| 品 種            | 施肥例        | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                    |                         |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                |            | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                        | 基肥 kg/10a               | 穂肥 kg/10a                           |
| あさひの夢<br>(早植)  | 基肥<br>* 追肥 | BB オール14〔14-14-14〕                                                                  | 30～40                   |                                     |
|                |            | BBNK-505号〔15-0-15〕 又は<br>BB 水口ポン太〔20-0-20〕                                          |                         | 20～25<br>15～20                      |
|                | 基肥一発肥料     | BB ファイト055〔30(15)-5-5〕 又は<br>BB コメトレ400〔24(12)-10-10〕又は<br>BB 飼料米専用211〔20(8)-10-10〕 | 25～35<br>30～40<br>35～45 | (3.8～5.3)<br>(3.6～4.8)<br>(2.8～3.6) |
| あさひの夢<br>(普通植) | 基肥<br>* 追肥 | BB オール14〔14-14-14〕                                                                  | 30～40                   |                                     |
|                |            | BBNK-505号〔15-0-15〕 又は<br>BB 水口ポン太〔20-0-20〕                                          |                         | 15～20<br>10～15                      |
|                | 基肥一発肥料     | BB ファイト055〔30(15)-5-5〕 又は<br>BB コメトレ400〔24(12)-10-10〕又は<br>BB 飼料米専用211〔20(8)-10-10〕 | 15～25<br>20～30<br>25～35 | (2.3～3.8)<br>(2.4～3.6)<br>(2～2.8)   |

## 2 陸 稲

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 500～1,000 kg

| 栽培型   | 品種名        | 栽植様式         | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |            |              | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普通期栽培 | トヨハタモチ     | 条播畦幅<br>60cm |           |    |    |    | ○  | ①  | ②  | □  |    |     |     |     |
|       | ゆめの<br>はたち |              |           |    |    |    | ○  | ①  | ②  | □  |    |     |     |     |

トヨハタモチ

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 4  | — | 7   | — | 6  |
| (穂肥)     | 4  | — | 0   | — | 4  |

| 施 肥 例         | ( )内は被覆肥料からの窒素成分               |           |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
|               | 肥 料 名〔保証成分%〕                   | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料        | BB うど専用555号〔15(7.5)-15-15-Mg1〕 | 45～55     | (3.4～4.1) |
| 基肥<br>*<br>追肥 | BB-286号〔12-18-16〕              | 30～35     |           |
|               | BBNK-505号〔15-0-15〕             |           | ①②10～13   |

ゆめのはたち

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | — | 8   | — | 6  |
| (穂肥)     | 4  | — | 0   | — | 4  |

| 施 肥 例         | ( )内は被覆肥料からの窒素成分               |           |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
|               | 肥 料 名〔保証成分%〕                   | 基肥 kg/10a | 穂肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料        | BB うど専用555号〔15(7.5)-15-15-Mg1〕 | 50～60     | (3.7～4.5) |
| 基肥<br>*<br>追肥 | BB-286号〔12-18-16〕              | 40～45     |           |
|               | BBNK-505号〔15-0-15〕             |           | ①②10～13   |

### 3 麦類

#### (1) 二条大麦

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 60～100 kg又は OM-37 100kg

| 栽培型        | 品種名              | 播種量       | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------|------------------|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|            |                  |           | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ドリル播<br>栽培 | ニューサチホ<br>ゴールドデン | 8.5<br>kg |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|            | とちのいぶき           | 8 kg      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

#### ニューサチホゴールドデン

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 6.5～8.0 — 13 — 11

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                             |                 |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                                                                   | 基肥 kg/10a       | 追肥 kg/10a              |
| 基肥一発肥料 | BB ビール麦2号 [8(1.5)-18-16-Mg2](黒ボク土) 又は<br>BB ビール麦エース [14(5.6)-18-14-Mg1](沖積土) | 80～100<br>45～55 | (1.2～1.5)<br>(2.5～3.1) |
| 基肥     | BB ビール麦ライト002 [10-30-12](黒ボク土) 又は<br>ビール麦化成日の本高度 30号 [8-12-10-Mg4]           | 65～80<br>80～100 |                        |

#### とちのいぶき

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 6.0～7.5 — 13 — 11

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                            |                |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                                                                  | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a              |
| 基肥一発肥料 | BB ビール麦2号 [8(1.5)-18-16-Mg2](沖積土) 又は<br>BB ビール麦エース [14(5.6)-18-14-Mg1](砂質土) | 75～90<br>40～50 | (1.1～1.3)<br>(2.2～2.8) |
| 基肥     | BB ビール麦ライト002 [10-30-12](黒ボク土) 又は<br>ビール麦化成日の本高度30号 [8-12-10-Mg4]           | 60～75<br>75～90 |                        |

## (2) 六条大麦

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 800 kg、苦土炭カル 60～100 kg又は OM-37 100kg

| 栽培型   | 品種名   | 播種量  | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |      | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ドリル播栽 | シュンライ | 7 kg |       |    |    |    |    |    |    |    |    | ○   |     |     |
|       |       |      |       |    |    |    |    | □  |    |    |    |     |     |     |

シュンライ

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 6～7 — 13 — 11

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                 |                |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                                                                       | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a               |
| 基肥一発肥料 | BB シュンライ242 [12(2.4)-14-12-Mg1] (沖積土) 又は<br>BB ビール麦エース [14(5.6)-18-14-Mg1] (砂質土) | 50～60<br>40～50 | (1.2～1.4)<br>(2.24～2.8) |
| 基肥     | BB ビール麦ライト002 [10-30-12] (黒ボク土) 又は<br>ビール麦化成284 [12-18-14]                       | 60～70<br>50～60 |                         |

## (3) 小 麦

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 800 kg、苦土炭カル 60～100 kg又は OM-37 100kg

| 栽培型   | 品種名              | 播種量    | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|------------------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |                  |        | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ドリル播栽 | イワイノダイチ<br>さとのそら | 7～8 kg |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|       | タマイズミ<br>ゆめかおり   | 8～9 kg |       |    |    |    |    | □  |    |    |    | ○   |     |     |

イワイノダイチ  
さとのそら

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 10～11 — 13 — 11

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分             |           |           |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                   | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料 | BB ビール麦エース[14(5.6)-18-14]    | 70～80     | (3.9～4.5) |
| 基肥     | 石灰窒素入り BB284 [12-18-14-Al10] | 80～90     |           |

## タマイズミ

窒素　－　りん酸　－　加里  
 施肥基準(基肥)　　11　－　　9　－　　9

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                        |             |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                            | 基肥 kg/10a   | 追肥 kg/10a          |
| 基肥一発肥料 | BB タマイズミ専用866〔18(12)-16-16〕　又は<br>BB タマイズミ専用666〔16(8.7)-16-16〕                          | 60<br>60～70 | (7.2)<br>(5.2～6.1) |
|        | 出穂 10 日後(出穂時の止葉葉色 SPAD48 以下の場合)<br>に次を追肥する<br>硫安〔21-0-0〕　　　　　　　　　　　　　　　又は<br>尿素〔46-0-0〕 |             | 10～20<br>5～10      |

## ゆめかおり

窒素　－　りん酸　－　加里  
 施肥基準(基肥)　　12　－　　9　－　　9  
                  (追肥)　2～4　－　　0　－　　0

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                     |                |                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                         | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a               |
| 基肥一発肥料 | BB ゆめかおり専用044〔20(13.3)-14-14〕　又は<br>BB ゆめかおり専用422〔24(19)-12-12〕                      | 60～70<br>50～60 | (8.0～9.3)<br>(9.5～11.4) |
|        | 出穂期以降(出穂時の止葉葉色 SPAD40 以下の場合)<br>に次を追肥する<br>硫安〔21-0-0〕　　　　　　　　　　　　　　　又は<br>尿素〔46-0-0〕 |                | 10～20<br>5～10           |

# 豆 ・ 雑 穀 類

## 4 大豆・小豆・ささげ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 80 kg又は OM-37 100kg

| 作物名 | 栽培型   | 品 種 名  | 栽植様式             | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-------|--------|------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |       |        |                  | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 大豆  | 普 通 栽 | 里のほほえみ | 60cm×10cm<br>1本立 |           |    |    |    |    | ○  | ←  | →  |    | □   |     |     |
| 小豆  | 普 通 栽 | 大 納 言  | 60cm×30cm<br>1本立 |           |    |    |    |    |    | ○  | ←  | →  | □   |     |     |
| ささげ |       |        | 60cm×10cm<br>1本立 |           |    |    |    |    |    | ○  | ←  | →  | □   |     |     |

### 普通栽培

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 2 — 8 — 8

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                     |                           |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                         | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a              |
| 基肥     | BB-500号〔5-20-20-Mg1〕 又は<br>BB-042号〔10-14-12-Mg2〕<br>(土壌のりん酸・加里が多い場合) | 35～45<br>20               |                        |
| 有機基肥   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                  | 40                        |                        |
| 基肥一発肥料 | BB 大豆専用ひとふりくん〔15(12)-18-18〕<br>BB.大豆一発 044〔20(12)-14-14〕             | 60～80<br>40～60<br>※低地力の場合 | (7.2～9.6)<br>(4.8～7.2) |

## 5 そ ば

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 500 kg、苦土炭カル 40 kg

| 栽 培 型 | 品 種 名 | 栽植様式   | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|--------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |        | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 秋 栽 培 | 在 来 種 | 60cm条播 |           |    |    |    |    |    |    | ○  | ←  | →   | □   |     |

### 秋栽培

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 1～2 — 4 — 4

| 施 肥 例 | 肥 料 名〔保証成分%〕                                 | 基肥 kg/10a      |
|-------|----------------------------------------------|----------------|
| 基肥    | BB-500号〔5-20-20-Mg1〕 又は<br>BB-286号〔12-18-16〕 | 20～40<br>10～20 |
| 有機基肥  | マックス有機666〔6-6-6〕                             | 20～30          |

## 6 らっかせい

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型   | 品種名            | 栽植様式                       | 作型模式図 |    |    |    |        |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|----------------|----------------------------|-------|----|----|----|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |                |                            | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月     | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| マルチ栽培 | 千葉半立<br>ナカテユタカ | 45cm×24cm<br>の2条<br>畦幅55cm |       |    |    |    | マ<br>○ |    | ←→ |    | □  |     |     |     |

### マルチ栽培

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 2～4 — 12 — 12

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                         |                |                        |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                                               | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a              |
| 基肥     | BB-286号〔12-18-16〕<br>BB-500号〔5-20-20-Mg1〕<br>又は          | 20～40<br>40～80 |                        |
| 有機基肥   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                      | 40～60          |                        |
| 基肥一発肥料 | BB 大豆専用ひとふりくん〔15(12)-18-18〕<br>BB.大豆一発 044〔20(12)-14-14〕 | 20～30<br>10～20 | (2.4～3.6)<br>(1.2～2.4) |

## 7 はとむぎ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型 | 品種名   | 栽植様式   | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |       |        | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|     | あきしずく | 60cm条播 |       |    |    |    | ○  | ①  | ②  |    |    | □   |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 7 — 13 — 13  
 (追肥) 6 — 0 — 0

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分           |           |           |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                 | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料 | BB うど専用555号〔15(7.5)-15-15〕 | 80～90     | (6.0～6.7) |
| 基肥*追肥  | BB-286号〔12-18-16〕          | 55～65     |           |
|        | 硫安〔21-0-0〕                 |           | ①②10～15   |

# い も 類

## 8 ばれいしょ

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 40 kg

| 栽 培 型 | 品 種 名                         | 栽植様式                 | 作 型 模 式 図 |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------------------------------|----------------------|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |                               |                      | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 春まき栽培 | 男しゃく<br>トヨシロ<br>(加工)<br>メーカーン | 60cm×30cm<br>5, 500株 |           |    | ○  |    | ①<br>←→ | □  |    |    |    |     |     |     |

### 春まき栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 9  | — | 16  | — | 15 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 3  |

| 施 肥 例                        | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                     |                                    |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                              | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                         | 基肥 kg/10a                          | 追肥 kg/10a |
| 緩効基肥<br>+<br>りん酸・加里          | CDU入 BB—S444号〔14-14-14〕 及び<br>過りん酸石灰〔0-17-0〕 及び<br>硫酸加里〔0-0-50〕                      | 80～90<br>20～30<br>10～15            |           |
| 基肥<br>+<br>りん酸・加里<br>*<br>追肥 | BB.S888号〔8-8-8-Mg2〕 又は<br>BB—S550号〔15-15-10〕 及び<br>過りん酸石灰〔0-17-0〕 及び<br>硫酸加里〔0-0-50〕 | 110～120<br>60～65<br>20～30<br>10～20 |           |
|                              | 磷硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                                  |                                    | 15～20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥            | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                  | 140～160                            | 40～60     |
| 基肥一発肥料                       | BB ぐんぐん野菜肥料484〔14(5.6)-18-14〕                                                        | 70～80                              | (3.9～4.5) |

## 9 かんしょ

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 40 kg

| 栽培型            | 品種名   | 栽植様式                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|----------------|-------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                |       |                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| マルチ栽培<br>(早掘り) | ベニアズマ | 60cm×36cm<br>4,600株 |           |    |    |    | ○  |    |    |    | □  |     |     |     |

### マルチ栽培(早掘り)

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 4 — 10 — 12

| 施肥例                 | 肥料名〔保証成分%〕                                                     | 基肥 kg/10a               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 緩効基肥<br>+<br>りん酸・加里 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕 | 25～30<br>10～20<br>10～15 |
| 有機基肥                | マックス有機666〔6-6-6〕                                               | 60～80                   |

## 10 さといも

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 40 kg

| 栽培型              | 品種名                       | 栽植様式                                       | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |                           |                                            | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| マルチ栽培<br>(露地・湛水) | 愛知早生<br>女早生<br>土垂系<br>善光寺 | 60cm×30cm<br>55cm×60cm<br>2,380～<br>4,600株 |           |    | ○  | ○  |    | ①  |    |    |    | □   |     |     |

※⇔:湛水期間。

### マルチ栽培

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 17 — 20 — 17  
 (追肥) 5 — 0 — 5

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                          |                    |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                                | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a               |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕<br>BB さといも専用〔15(9)-15-15-Mg1〕 | 140～150<br>105～135 | (7.8～8.4)<br>(9.4～12.1) |
| 緩効基肥              | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                                   | 140～150            |                         |
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | BB.S888号〔8-8-8-Mg2〕<br>燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                | 200～220            | 30～35                   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                       | 280～300            | 80～90                   |

## 11 やまのいも

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,500 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型  | 品種名   | 栽植様式                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |       |                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普通栽培 | やまといも | 60cm×30cm<br>5,500株 |           |    |    | ○  |    |    | ①  |    |    |     |     |     |

### 普通栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 20  | — | 20 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 0  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                            |          |                           |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                                                  |          | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a                 |
| 基肥一発肥料            | BBトマト専用2号〔10(7)-14-10〕<br>BBねぎ専用S555〔15(9)-15-15〕                           | 又は       | 160～180<br>100～120        | (11.2～12.6)<br>(9.0～10.8) |
| 緩効基肥<br>*<br>追肥   | CDU入BB-S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>IB尿素入ジシアン444〔14-14-14〕 | 又は<br>又は | 100～120<br>100<br>100～120 |                           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                  |          |                           | 20～25                     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                         |          | 240～260                   | 80～90                     |

# 野菜類（果菜類）

## 12 いちご

### (1) とちおとめ

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型   | 品種名   | 栽植様式                                          | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                                               | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夜冷育苗  | とちおとめ | 120cm×<br>23～25cm<br>2条高畦<br>6,500～<br>7,200株 |       |    |    |    |    | ○  | ▲  | ×  | ×  | □   |     |     |
| 株冷処理  | とちおとめ | 〃                                             |       |    |    |    |    | ○  | 冷  | ×  | ×  | □   |     |     |
| 高冷地育苗 | とちおとめ | 〃                                             |       |    |    |    |    | ○山 |    | 山  | ×  | □   |     |     |
| ポット育苗 | とちおとめ | 〃                                             |       |    |    |    |    | ○  |    |    | ×  | □   |     |     |
| 平地育苗  | とちおとめ | 〃                                             |       |    |    |    |    | ○  |    |    | ×  | □   |     |     |

注 ○は採苗・仮植 ▲は夜冷処理を示す。

夜冷育苗, 株冷蔵処理, 高冷地育苗,  
ポット育苗

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 20  | — | 20 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 土壌診断<br>結果   | 施肥例                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                     |                               |                   |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|              |                     | 肥料名〔保証成分%〕                                                                           | 基肥 kg/10a                     | 追肥 kg/10a         |
| おおむね<br>基準値内 | 基肥一発肥料              | BB とちおとめ [8(5)-10-6-Mg2]                                                             | 200～240                       | (10～12)           |
|              | 基肥一発肥料<br>+<br>有機基肥 | BB とちおとめ [8(5)-10-6-Mg2]及び<br>BB マックス有機666 [6-6-6]                                   | 100～120<br>180～200            | (5～6)             |
|              | 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥 | BB プレミア有機433 [4-3-3] 又は<br>BB マックス有機666 [6-6-6] 又は<br>BB 別格655 [6-5-5]               | 370～380<br>240～260<br>240～260 |                   |
|              |                     | はつらつ君733 [7-3-3]                                                                     |                               | 15×5回<br>(月に1～2回) |
|              | BB 基肥<br>*<br>液肥追肥  | BB-286号 [12-18-16] 又は<br>BB-473号 [14-17-13]<br>液肥1号 [12-5-7] 又は<br>まるとく液肥和み [10-3-4] | 110～130<br>100～110            | 10×5回<br>(月に1～2回) |

|          |                  |                                                                      |                    |                    |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| りん酸の多い土壌 | 基肥一発肥料           | BB 有機とちおとめ V 号<br>〔8(3)-4-8-Mg3〕 又は<br>BB 果菜用肥料826<br>〔8(5)-2-6-Mg2〕 | 200～240<br>200～240 | (6～7.2)<br>(10～12) |
|          | 有機基肥             | BB プレミア有機 433 〔4-3-3〕 又は<br>BB 別格816 〔8-1-6〕                         | 360～380<br>180～190 |                    |
| 加里の多い土壌  | 基肥一発肥料           | BB 果菜用肥料822<br>〔8(5)-2-2-Mg3〕                                        | 200～220            | (10～11)            |
|          | 有機基肥             | BB プレミア有機433 〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833 〔8-3-3〕                      | 370～380<br>180～200 |                    |
| 一発追肥     | 上記の追肥に代えて基肥と同時施用 | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                                           | 25～35              | (4.0～5.6)          |

#### 平地育苗（とちおとめ）

窒素 — りん酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 18 — 20 — 20  
 (追肥) 5 — 0 — 5

| 土壌診断結果   | 施肥例                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                     |                               |                      |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|          |                     | 肥料名〔保証成分%〕                                                           | 基肥 kg/10a                     | 追肥 kg/10a            |
| おおむね基準値内 | 基肥一発肥料              | BB とちおとめ 〔8(5)-10-6-Mg2〕                                             | 210～250                       | (10.5～12.5)          |
|          | 基肥一発肥料 + 有機基肥       | BB とちおとめ 〔8(5)-10-6-Mg2〕及び<br>BB マックス有機666 〔6-6-6〕                   | 140～160<br>180～200            | (7～8)                |
|          | 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥 | BB プレミア有機433 〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機666 〔6-6-6〕 又は<br>別格655 〔6-5-5〕  | 440～460<br>290～310<br>300～340 |                      |
|          |                     | はつらつ君733 〔7-3-3〕                                                     |                               | 15×5回<br>(月に1～2回)    |
|          | BB 基肥 *<br>液肥追肥     | BB-286号 〔12-18-16〕 又は<br>BB-473号 〔14-17-13〕                          | 150～160<br>120～130            |                      |
|          |                     | 液肥1号 〔12-5-7〕 又は<br>まるとく液肥和み 〔10-3-4〕                                |                               | 15×5回<br>(月に1～2回)    |
| りん酸の多い土壌 | 基肥一発肥料              | BB 有機とちおとめ V 号<br>〔8(3)-4-8-Mg3〕 又は<br>BB 果菜用肥料826<br>〔8(5)-2-6-Mg2〕 | 240～260<br>240～260            | (7.2～7.8)<br>(12～13) |
|          | 有機基肥                | BB プレミア有機433 〔4-3-3〕 又は<br>BB 別格816 〔8-1-6〕                          | 440～460<br>220～240            |                      |
| 加里の多い土壌  | 基肥一発肥料              | BB 果菜用肥料822<br>〔8(5)-2-2-Mg3〕                                        | 240～260                       | (12～13)              |
|          | 有機基肥                | BB プレミア有機433 〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833 〔8-3-3〕                      | 440～460<br>220～240            |                      |
| 一発追肥     | 上記の追肥に代えて基肥と同時施用    | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                                           | 25～35                         | (4.0～5.6)            |

#### 基肥施肥し、畝上げ後土壌消毒する栽培に適した基肥肥料 UF:水に溶けにくい緩効性の窒素肥料

| 施肥例                | 肥料名〔保証成分%〕                            | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a         |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| BB 基肥<br>*<br>液肥追肥 | BB いちごUF644 〔6-4-4〕                   | 140～200   |                   |
|                    | 液肥1号 〔12-5-7〕 又は<br>まるとく液肥和み 〔10-3-4〕 |           | 10×5回<br>(月に1～2回) |

## (2)スカイベリー

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型   | 品 種 名  | 栽植様式                                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |     |     |
|-------|--------|-------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|-----|-----|
|       |        |                                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月    | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ポット育苗 | スカイベリー | 120cm×25cm<br>2条高畦<br>6,000～6,500株  |           |    |    |    |    |    | ○  | ----- | ×  | □   |     |     |
|       |        | 105×18～21cm<br>1条高畝<br>4,500～5,500株 |           |    |    |    |    |    |    |       |    |     |     |     |

### ポット育苗

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 20  | — | 20 |
| (追肥)     | 10 | — | 0   | — | 5  |

| 土壌診断結果       | 施 肥 例                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                  |                               |                      |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|              |                           | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                      | 基肥 kg/10a                     | 追肥 kg/10a            |
| おおむね<br>基準値内 | 基肥一発肥料                    | BB とちおとめ〔8(5)-10-6-Mg2〕                                                           | 200～240                       | (10～12)              |
|              | 基肥一発肥料<br>+有機基肥<br>+基肥時追肥 | BB とちおとめ〔8(5)-10-6-Mg2〕及び<br>BB マックス有機666〔6-6-6〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 100～120<br>110～120<br>50～60   | (5～6)<br>(8～9.6)     |
|              | 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥       | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕               | 240～260<br>160～170<br>160～170 |                      |
|              |                           | はつらつ君733〔7-3-3〕                                                                   |                               | 25～30×5回<br>(月に1～2回) |
|              | BB 基肥<br>*<br>液肥追肥        | BB-286号〔12-18-16〕 又は<br>BB-473号〔14-17-13〕                                         | 80～90<br>70～80                |                      |
|              |                           | 液肥1号〔12-5-7〕                                                                      |                               | 15～20×5回<br>(月に1～2回) |
| 一発追肥         | 上記の追肥に代えて<br>基肥と同時施用      | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                                                        | 60～70                         | (9.6～11.2)           |

### (3)とちひめ

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型   | 品 種 名 | 栽植様式                               | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ポット育苗 | とちひめ  | 120cm×25cm<br>2条高畦<br>6,000～6,500株 |           |    |    |    |    |    | ○  |    | ×  | □   |     |     |
|       |       |                                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

#### ポット育苗

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 20  | — | 20 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 土壌診断<br>結果     | 施 肥 例 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分 |           |           |
|----------------|-------|------------------|-----------|-----------|
|                |       | 肥 料 名〔保証成分%〕     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 前記(1) とちおとめに同じ |       |                  |           |           |

### (4)なつおとめ

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型   | 品 種 名 | 栽植様式                                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ポット育苗 | なつおとめ | 120×24～27cm<br>2条高畦<br>6,000～7,000株 |           |    | □  |    |    |    |    |    |    | ○   |     |     |
| 平地育苗  |       |                                     |           |    | ×  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

#### ポット育苗・平地育苗

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 16 | — | 11  | — | 26 |
| (追肥)     | 4  | — | 4   | — | 4  |

| 土壌診断結果   | 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                |                           |           |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|          |                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                    | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a |
| おおむね基準値内 | 基肥一発肥料＋加里         | BB とちおとめ〔8(5)–10–6–Mg2〕及び硫酸加里〔0–0–50〕                           | 200～240<br>15～20          | (10～12)   |
|          | 有機基肥＋加里<br>＋基肥時追肥 | BB マックス有機666〔6–6–6〕及び硫酸加里〔0–0–50〕及びBBNKプラス 160〔16(16)–0–20–Mg1〕 | 240～260<br>10～15<br>20～25 | (3.2～4.0) |

## (5)とちあいか

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽 培 型 | 品 種 名 | 栽植様式                                          | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |     |     |
|-------|-------|-----------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|-----|-----|
|       |       |                                               | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月    | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ポット育苗 | とちあいか | 120cm×<br>23～25cm<br>2条高畦<br>6,500～<br>7,200株 |           |    |    |    |    |    |    |       |    |     |     |     |
|       |       |                                               |           |    |    |    |    |    | ○  | ----- | ×  | □   |     |     |
|       |       |                                               |           |    |    |    |    |    |    |       |    |     |     |     |

## ポット育苗

|          |       |   |     |   |    |
|----------|-------|---|-----|---|----|
|          | 窒素    | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10～12 | — | 20  | — | 13 |
| (追肥)     | 10    | — |     | — | 13 |

| 土壌診断<br>結果   | 施 肥 例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                             |                             |                     |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|              |                     | 肥 料 名<br>〔保証成分%〕                                                                             | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a           |
| おおむね<br>基準値内 | 基肥一発肥料＋<br>りん酸＋加里   | BB とちあいか<br>〔8(6)–4–6〕 及び<br>苦土重焼燐<br>〔0–35–0–Mg4.5〕 及び<br>硫酸加里 〔0–0–50〕                     | 200～240<br>30～35<br>25～30   | (12.0～14.4)         |
|              | 有機基肥＋りん酸<br>＋基肥時追肥  | BB マックス有機666<br>〔6–6–6〕 及び<br>苦土重焼燐<br>〔0–35–0–Mg4.5〕 及び<br>BBNKプラス 160<br>〔16(16)–0–20–Mg1〕 | 160～200<br>20～30<br>60～75   | (9.6～12)            |
|              | 有機基肥＋りん酸<br>＋マルチ前追肥 | BB マックス有機666<br>〔6–6–6〕 及び<br>苦土重焼燐<br>〔0–35–0–Mg4.5〕 及び<br>NK プラスとちあいか<br>〔10–0–21–Si9–Mg1〕 | 160～200<br>20～30<br>100～120 | (10～12)             |
|              | 上記肥料＋液肥追肥           | まるとく液肥和み〔10–3–4〕                                                                             |                             | 20×5 回<br>(月に1～2 回) |

### 13 きゅうり

| 品 種 名                | 栽植様式                           | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |        |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------|
|                      |                                | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月    |
| ハイクグリーン22<br>極 光 607 | 170×40cm<br>1,500株             |           |    | ①  | ②  | ③  |    |    |    |    |     | ○   | ○<br>△ |
| 春 栄<br>マジカル2号        | 150×50cm<br>1,000株             |           |    |    | △  | ①  | ②③ |    |    |    |     |     |        |
| 福 富                  | 250×50cm<br>800株               |           |    |    | ○  | △  | ①  | ②  |    |    |     |     |        |
| 恵 の 風<br>エクセレント2号    | 250×45cm<br>(条間70cm)<br>1,400株 |           |    |    |    |    |    |    | ○  | △  | ①②  |     |        |

ハウス冬春どり

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 120 kg

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 25 — 35 — 25

(追肥) 15 — 0 — 15

| 土壌診断<br>結果   | 施 肥 例                    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                   |                               |                          |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|              |                          | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                       | 基肥 kg/10a                     | 追肥 kg/10a                |
| おおむね<br>基準値内 | 緩効基肥<br>*<br>液肥追肥        | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕又は<br>CDU磷加安S555たまご〔15-15-15〕又は<br>スーパーIBS222〔12-12-12-Mg1〕 | 170～180<br>160～170<br>200～220 |                          |
|              |                          | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                                                                   |                               | ①②③50                    |
|              | 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥      | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕                                          | 400～460<br>400～460            |                          |
|              |                          | はつらつ君733〔7-3-3〕                                                                    |                               | ①②③65～75                 |
| りん酸の<br>多い土壌 | 基肥一発肥料                   | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15〕 又は<br>BB 玉ねぎ464〔14(9.8)-16-14〕                           | 200～220<br>240～260            | (15～16.5)<br>(23.5～25.5) |
|              | 基肥一発肥料                   | BB 果菜用肥料826〔8(5)-2-6-Mg2〕                                                          | 400～440                       | (20～22)                  |
|              | 有機基肥                     | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB 別格816〔8-1-6〕                                          | 600～640<br>300～320            |                          |
| 加里の<br>多い土壌  | 基肥一発肥料                   | BB 果菜用肥料822〔8(5.6)-2-2-Mg3〕                                                        | 400～440                       | (20～22)                  |
|              | 有機基肥                     | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕                                      | 600～660<br>300～320            |                          |
| 一発追肥         | 上記の追肥に代<br>えて<br>基肥と同時施用 | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                                                         | 90～100                        | (14.4～16)                |

# 初夏どり

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 120 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | － | 28  | － | 20 |
| (追肥)     | 15 | － | 0   | － | 15 |

| 土壌診断<br>結果   | 施 肥 例                    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                   |                    |             |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|              |                          | 肥 料 名〔保証成分%〕                                       | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a   |
| おおむね<br>基準値内 | 緩効基肥                     | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 140～150<br>130～140 |             |
|              | 有機基肥                     | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕          | 320～340<br>320～360 |             |
|              | 基肥一発肥料                   | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15〕                          | 200～220            | (15～16.5)   |
| りん酸の<br>多い土壌 | 有機基肥                     | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB 別格816〔8-1-6〕          | 420～500<br>200～260 |             |
| 加里の<br>多い土壌  | 有機基肥                     | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕      | 420～500<br>200～260 |             |
| 一発追肥         | 上記の追肥に代<br>えて<br>基肥と同時施用 | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                         | 70～90              | (11.2～14.4) |
| 時期追肥         | 追肥時期に施用                  | BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕                       |                    | ①②③50       |

# 夏秋どり

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 120 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | － | 25  | － | 20 |
| (追肥)     | 10 | － | 0   | － | 10 |

| 施 肥 例                        | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |                    |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                              | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a   |
| 緩効基肥<br>＊<br>追肥              | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 140～150<br>130～140 |             |
|                              | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                   |                    | ①②30～35     |
| 有機基肥 ＊<br>有機追肥               | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 320～360            | ①②80～90     |
| 基肥一発肥料                       | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15〕                             | 160～180            | (12.0～13.5) |
| 一発追肥<br>上記の追肥に代え<br>て基肥と同時施用 | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                            | 40～60              | (6.4～9.6)   |
| 追肥時期に施用                      | BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕                          |                    | ①②50        |

## ハウス秋どり

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,500 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | － | 10  | － | 5  |
| (追肥)     | 10 | － | 0   | － | 10 |

| 施 肥 例           | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |                |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                 | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| 緩効基肥<br>*<br>追肥 | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 35～40<br>30～35 |           |
|                 | 液肥2号〔10-4-8〕                                          |                | ①②50      |
| 基肥一発肥料          | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                           | 100～110        | (5.6～6.1) |

## 14 すいか

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg

| 栽 培 型 | 品 種 名 | 栽植様式                    | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                         | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 半促成栽培 | 紅こだま  | 300cm×<br>100cm<br>330株 |           |    |    |    | ①  |    |    |    |    |     |     |     |


### 半促成

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 20  | － | 15 |
| (追肥)     | 5  | － | 0   | － | 5  |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                       |           |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                           | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a      |
| 基肥<br>*<br>追肥     | BB－473号〔14-17-13〕                                      | 100～120   |                |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕 又は<br>BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕 |           | 30～35<br>45～55 |
| 緩効基肥              | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕                                | 140～150   |                |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                    | 240～260   | 80～90          |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                            | 120～140   | (6.7～7.8)      |

## 15 メロン

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型 | 品種名          | 栽植様式             | 作 型 模 式 図                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |              |                  | 1月                                                                                 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 半促成 | クインシー<br>タカミ | 120×90cm<br>920株 |  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 半促成

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | — | 18  | — | 12 |
| (追肥)     | 6  | — | 0   | — | 6  |

| 施肥例                          | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                          |                           |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              | 肥料名〔保証成分%〕                                                                                | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a            |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥          | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕<br>又は                                              | 80～90<br>80～90            |                      |
|                              | はつらつ君733〔7-3-3〕                                                                           |                           | 40×2回                |
| BB 基肥+りん酸<br>*<br>液肥追肥       | BB -286号〔12-18-16〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>及び                                           | 40～50<br>20～30            |                      |
|                              | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                                                                          |                           | 30×2回                |
| 基肥一発肥料<br>+<br>りん酸           | BB トマト専用2号〔10(6.5)-14-10〕<br>BB うど専用555〔15(7.5)-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>又は<br>及び | 100～120<br>60～80<br>20～30 | (6.5～7.8)<br>(4.5～6) |
| 一発追肥<br>上記の追肥に代えて<br>基肥と同時施用 | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                                                                | 35～40                     | (5.6～6.4)            |
| 追肥<br>上記の追肥に代えて<br>必要時期に施用   | BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕                                                              |                           | ①②30～40              |

## 16 かぼちゃ

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型         | 品種名                                    | 栽植様式                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|             |                                        |                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 初夏どり<br>夏どり | ほっこり123<br>イーティ2<br>ほっこりえびす<br>ニューなかやま | 300×100<br>330～500株 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 初夏どり・夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 13 | — | 22  | — | 13 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                    |    |                    |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----|--------------------|----------------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                          |    | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a      |
| 緩効基肥              | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕  | 又は | 120～140<br>110～130 |                |
| 基肥<br>*<br>追肥     | BB-372号〔13-17-12〕<br>燐硝安加里1号〔15-15-12〕              | 又は | 90～110<br>80～90    |                |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕<br>BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕 | 又は |                    | 30～35<br>45～55 |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                 |    | 200～220            | 80～90          |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                         |    | 120～130            | (6.7～7.3)      |

## 17 ズッキーニ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型    | 品種名   | 栽植様式                          | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------|-------|-------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|        |       |                               | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| トンネル早熟 | K Z 2 | 150～180×<br>80～90<br>330～500株 |       |    | ○  | ×  | ①  | ②  |    |    |    |     |     |     |
| 露地抑制   | K Z 2 | 150～180×<br>80～90<br>330～500株 |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ×  | ①   | ②   |     |

### トンネル早熟・露地抑制

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | — | 12  | — | 12 |
| (追肥)     | 8  | — | 0   | — | 8  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分            |           |           |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                  | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 緩効基肥<br>*<br>追肥   | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕     | 100～120   |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕         |           | ②20～40    |
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕      | 110～130   |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕         |           | ①②20～30   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕         | 190～210   | ①②60～70   |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕 | 140～160   | (7.8～9.0) |

## 18 にがうり

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型    | 品種名     | 栽植様式 | 作型模図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------|---------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|        |         |      | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 雨よけハウス | 百成レイシ2号 |      |      | ○  | ○  | ×  |    | ①  | ②  | ③  | ④  |     |     |     |
| 普通     | 百成レイシ2号 |      |      |    | ○  | ×  | ○  | ①  | ②  | ③  |    |     |     |     |

### 雨よけハウス

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | — | 25  | — | 12 |
| (追肥)     | 8  | — | 0   | — | 8  |

| 施肥例                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                   |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|
|                         | 肥料名〔保証成分%〕                                         | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a  |
| 緩効基肥<br>+りん酸<br>*<br>追肥 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕  | 100～120<br>20～30 |            |
|                         | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                |                  | ①～④10～15   |
| 基肥+りん酸<br>*<br>追肥       | BB-372号〔13-17-12〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕        | 90～100<br>20～30  |            |
|                         | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                |                  | ①～④10～15   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥       | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                | 190～210          | ①～④30～40   |
| 基肥一発肥料<br>+りん酸          | BB ねぎ専用S555〔15(9)-15-15〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕 | 110～130<br>20～30 | (9.9～11.7) |

普通

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | － | 25  | － | 12 |
| (追肥)     | 6  | － | 0   | － | 6  |

| 施 肥 例                      | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                    |                  |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                            | 肥 料 名〔保証成分%〕                                        | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a |
| 緩効基肥＋<br>りん酸<br>＊<br>追肥    | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕   | 100～120<br>20～30 |           |
|                            | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                 |                  | ①～③10～20  |
| 基肥＋りん酸<br>＊<br>追肥          | BB－372号〔13-17-12〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕         | 90～100<br>20～30  |           |
|                            | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                 |                  | ①～③10～15  |
| 有機基肥 ＊<br>有機追肥             | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                 | 190～210          | ①～③30～40  |
| 基肥一発肥料<br>＋りん酸             | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕 | 100～120<br>20～30 | (7.5～9.0) |
| 一発追肥<br>上記追肥に代え<br>基肥と同時施用 | BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕                          | 30～40            | (4.8～6.4) |

# 19 なす

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 160 kg

| 栽培型             | 品種名        | 栽植様式                                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                 |            |                                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏秋どり            | 千両2号<br>式部 | 160～200<br>×60cm<br>800株～<br>1,000株 |           | ○  | ×  | ○  | ×  | ①  | ②  | ③  |    |     |     |     |
| 春夏どり            | 千両2号<br>式部 | 180×55cm<br>2条<br>(条間30)<br>2,000株  |           | ○  | ×  | ①  | ②  | ③  | ④  | ⑤  |    |     |     |     |
| 冬春どり<br>(ハウス越冬) | 式部         | 170～190<br>×65cm<br>850株            |           |    | ④  | ⑤  | ⑥  | ⑦  | ○  | ×  | ①  | ②   | ③   |     |

## 夏秋どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 20  | — | 15 |
| (追肥)     | 15 | — | 0   | — | 15 |

| 施肥例                     | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                  |                           |                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                         | 肥料名〔保証成分%〕                                                                                        | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a                          |
| 基肥一発肥料                  | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕                                                                      | 240～280                   | (15.6～18.2)                        |
| 基肥一発＋<br>基肥時に<br>追肥成分増施 | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 及び<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 100～120<br>60～75<br>45～60 | (6.5～7.8)<br>(9.6～12)<br>(7.2～9.6) |
| BB 基肥<br>*<br>追肥        | BB-473号〔14-17-13〕<br>BB-NK606号〔16-0-16〕 又は<br>BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕                        | 100～120                   | ①～③30～35<br>①～③40～60               |
| 緩効基肥<br>*<br>追肥         | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>燐硝安加里S646号〔16-4-16〕 又は<br>サスペンション1号(ペースト肥料)〔10-10-10〕                  | 120～140                   | ②③30～35<br>②③45～55                 |
| 有機基肥<br>*<br>液肥追肥       | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>サスペンション1号(ペースト肥料)〔10-10-10〕 又は<br>はつらつ君733〔7-3-3〕                          | 240～260                   | ①～③50<br>①～③70                     |

(注)基肥一発肥料でも9月以降は生育状況によって追肥を考慮する。

# 春夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 25 | － | 35  | － | 25 |
| (追肥)     | 19 | － | 5   | － | 19 |

| 施 肥 例                       | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                  |                           |                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                      | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a                            |
| 基肥一発肥料<br>*<br>追肥           | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕                                                                      | 360～380                   | (25.2～26.6)                          |
|                             | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                                                                                  |                           | ④⑤30～40                              |
| 基肥一発<br>+<br>基肥時に<br>追肥成分増施 | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 及び<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 200～220<br>60～75<br>45～60 | (14.0～15.4)<br>(9.6～12)<br>(7.2～9.6) |
| 緩効基肥<br>*<br>追肥             | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                                                                           | 160～180                   |                                      |
|                             | BB-オール14〔14-14-14〕                                                                                |                           | ①35～40                               |
|                             | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                                                                                  |                           | ②④35～45<br>③⑤25～35                   |
| BB 基肥<br>*<br>追肥            | BB-473号〔14-17-13〕                                                                                 | 160～180                   |                                      |
|                             | BB-オール14〔14-14-14〕                                                                                |                           | ①35～40                               |
|                             | BB-NK606号〔16-0-16〕                                                                                |                           | ②④25～30<br>③⑤20～25                   |

# 冬春どり(ハウス越冬)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 25 | － | 35  | － | 25 |
| (追肥)     | 20 | － | 5   | － | 20 |

| 施 肥 例                       | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                  |                           |                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                      | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a                            |
| 基肥一発肥料<br>*<br>追肥           | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕                                                                      | 360～380                   | (25.2～26.6)                          |
|                             | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                                                                                  |                           | ④⑤30～40                              |
| 基肥一発<br>+<br>基肥時に<br>追肥成分増施 | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 及び<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 200～220<br>60～75<br>45～60 | (14.0～15.4)<br>(9.6～12)<br>(7.2～9.6) |
| 緩効基肥<br>*<br>追肥             | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                                                                           | 160～180                   |                                      |
|                             | BB-オール14〔14-14-14〕                                                                                |                           | ①35～40                               |
|                             | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                                                                                  |                           | ②④⑤35～45<br>③25～35                   |
| BB 基肥<br>*<br>追肥            | BB-473号〔14-17-13〕                                                                                 | 160～180                   |                                      |
|                             | BB-オール14〔14-14-14〕                                                                                |                           | ①30～40                               |
|                             | BB-NK606号〔16-0-16〕                                                                                |                           | ②④⑤25～30<br>③20～25                   |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥         | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                               | 400～460                   |                                      |
|                             | はつらつ君733〔7-3-3〕                                                                                   |                           | ①70～80<br>②④⑤50～60<br>③40～50         |
| 追肥                          | ⑥～⑦の追肥は草勢を見て行う                                                                                    |                           | ⑥⑦草勢考慮                               |

## 20 トマト

| 栽培型                 | 品種名                          | 栽植様式                                      | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                     |                              |                                           | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ハウス<br>長期どり<br>(越冬) | 麗容<br>マイロック                  | 120×36~<br>40cm<br>1条<br>2,100株~          | ②         | ③  | ④  | ⑤  |    |    | ○  | ×  | ①  |     |     |     |
| ハウス<br>冬春どり         | 麗容<br>CF桃太郎は<br>るか           | 200×40cm<br>2条<br>(条間<br>80cm)<br>2,100株~ | ①         | ②  | ③  | ④  |    |    | ○  | ×  | ①  |     |     |     |
| 半促成                 | 麗夏<br>りんか409<br>CF桃太郎は<br>るか | 同 上                                       | ①         | ②  | ③  |    |    |    | ○  | ×  | ①  |     |     |     |
| 抑 制                 | CF桃太郎は<br>るか<br>麗 夏          | 同 上                                       |           |    |    |    |    |    | ○  | ×  | ①  | ②   | ③   |     |
| 夏 どり                | 麗夏<br>CF桃太郎は<br>るか<br>りんか409 | 200×40cm<br>2条(条間<br>40cm)<br>2,500株      | ①         | ②  | ③  | ④  |    |    | ○  | ×  | ①  | ②   | ③   | ④   |
| ジュース用<br>ト マ ト      | カゴメ 993                      | 180×50cm<br>1,110株                        |           |    | ①  | ②  |    |    | ○  | ×  | ①  | ②   |     |     |

# ハウス長期どり(越冬)

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | — | 30  | — | 26 |
| (追肥)     | 25 | — | 13  | — | 45 |

| 施 肥 例                                                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                       | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                                                                                                                  | 基肥 kg/10a                                                         | 追肥 kg/10a                                                  |
| 基肥一発肥料<br>+<br>りん酸・加里<br>+<br>基肥時に不足追肥成分<br>施用:追肥作業省略 | BB 長期どりトマト専用838〔8(4)-3-8-Mg2〕<br>又は<br>BB トマト専用1号〔8(2)-12-8〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕(速効性)<br>けい酸加里〔0-0-20〕(緩効性)<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 200～220<br>200～220<br>80～100<br>20～30<br>20～30<br>90～105<br>30～45 | (8～8.8)<br>(4～4.4)<br><br><br><br>(14.4～16.8)<br>(4.8～7.2) |
|                                                       | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕                                                                                                                                                  | 320～340<br>320～340                                                |                                                            |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥<br>*<br>加里追肥                      | はつらつ君666〔6-6-6〕<br>はつらつ君733〔7-3-3〕<br>はつらつ K さん〔0-0-9-Si19〕                                                                                                                                   |                                                                   | ①80～90<br>②③④⑤60～80<br>②③④⑤60～70                           |

# ハウス冬春どり (黒ボク土)

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 18 | — | 25  | — | 23 |
| (追肥)     | 17 | — | 11  | — | 29 |

| 施 肥 例                                                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                                                                             |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                                                                                 | 基肥 kg/10a                                              | 追肥 kg/10a                                              |
| 基肥一発肥料<br>+<br>りん酸・加里<br>+<br>基肥時に不足追肥成分<br>施用:追肥作業省略 | BB トマト専用1号〔8(2)-12-8〕<br>又は<br>BB トマト専用2号〔10(7)-14-10〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 180～200<br>140～160<br>30～40<br>20～25<br>60～75<br>15～30 | (3.6～4)<br>(9.8～11.2)<br><br><br>(9.6～12)<br>(2.4～4.8) |
|                                                       | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕                                                                                                                 | 280～320<br>280～320                                     |                                                        |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥<br>*<br>加里追肥                      | はつらつ君666〔6-6-6〕<br>はつらつ君733〔7-3-3〕<br>はつらつ K さん〔0-0-9-Si19〕                                                                                                  |                                                        | ①80～90<br>②③④30～70<br>②③④40～60                         |

ハウス冬春どり(細粒沖積土)

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,500 kg、苦土炭カル 100 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 14 | — | 25  | — | 18 |
| (追肥)     | 16 | — | 10  | — | 28 |

| 施 肥 例                                                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                                                                          |                                                              |                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                       | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                                                                              | 基肥 kg/10a                                                    | 追肥 kg/10a                                               |
| 基肥一発肥料<br>+<br>りん酸・加里<br>+<br>基肥時に不足追肥成分<br>施用:追肥作業省略 | BBトマト専用1号〔8(2)-12-8〕<br>BBトマト専用2号〔10(7)-14-10〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕(速効性)<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 又は<br>140～160<br>120～140<br>30～40<br>20～25<br>60～75<br>15～30 | (2.8～3.6)<br>(8.4～9.8)<br><br><br>(9.6～12)<br>(2.4～4.8) |
|                                                       | 又は<br>BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕                                                                                                              | 220～240<br>220～240                                           |                                                         |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥<br>*<br>加里追肥                      | はつらつ君666〔6-6-6〕<br>はつらつ君733〔7-3-3〕<br>はつらつ K さん〔0-0-9-Si19〕                                                                                               |                                                              | ①60～70<br>②③④30～70<br>②③④40～60                          |

ハウス冬春どり(粗粒沖積土)

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 22  | — | 13 |
| (追肥)     | 16 | — | 10  | — | 28 |

| 施 肥 例                                                 | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                                                                     |                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                                                                         | 基肥 kg/10a                                                   | 追肥 kg/10a                                             |
| 基肥一発肥料<br>+<br>りん酸・加里<br>+<br>基肥時に不足追肥成分<br>施用:追肥作業省略 | BBトマト専用1号〔8(2)-12-8〕<br>BBトマト専用2号〔10(7)-14-10〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕<br>BB NK プラス160〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 又は<br>100～120<br>90～110<br>40～50<br>20～25<br>60～75<br>15～30 | (2～2.4)<br>(6.3～7.7)<br><br><br>(9.6～12)<br>(2.4～4.8) |
|                                                       | 又は<br>BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕                                                                                                         | 160～170<br>160～170                                          |                                                       |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥<br>*<br>加里追肥                      | はつらつ君666〔6-6-6〕<br>はつらつ君733〔7-3-3〕<br>はつらつ K さん〔0-0-9-Si19〕                                                                                          |                                                             | ①60～70<br>②③④30～70<br>②③④40～60                        |

## 半促成

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 18 | － | 18  | － | 18 |
| (追肥)     | 13 | － | 0   | － | 13 |

| 施 肥 例                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                         |                    |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                         | 肥 料 名〔保証成分%〕                                             | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a         |
| 基肥一発肥料                  | BB トマト専用2号〔10(7)-14-10〕                                  | 240～260            | (16.8～18.2)       |
| 緩効性基肥<br>＋<br>基肥時追肥成分施用 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 120～140<br>60～80   | (9.6～12.8)        |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥     | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕                | 280～320<br>280～320 |                   |
|                         | はつらつ君666〔6-6-6〕                                          |                    | ①80～90<br>②③60～70 |

## 抑 制

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | － | 22  | － | 13 |
| (追肥)     | 12 | － | 0   | － | 12 |

| 施 肥 例                       | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                   |                             |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                       | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a   |
| 基肥一発肥料                      | BB トマト専用2号〔10(7)-14-10〕                                                            | 170～190                     | (11.9～13.3) |
| 緩効性基肥＋りん酸<br>＋<br>基肥時追肥成分施用 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 80～100<br>20～40<br>60～80    | (9.6～12.8)  |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥         | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕 及び<br>焼成骨粉                               | 160～180<br>160～180<br>40～60 |             |
|                             | はつらつ君733〔7-3-3〕                                                                    |                             | ①②③50～60    |

## 夏どり

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 160 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | － | 25  | － | 16 |
| (追肥)     | 18 | － | 0   | － | 18 |

| 施 肥 例                       | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                   |                           |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                       | 基肥 kg/10a                 | 追肥 kg/10a          |
| 基肥一発肥料                      | BB トマト専用2号〔10(7)-14-10〕                                                            | 240～260                   | (16.8～18.2)        |
| 緩効性基肥＋りん酸<br>＋<br>基肥時追肥成分施用 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 120～140<br>20～40<br>80～90 | (12.8～14.4)        |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥         | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕                                          | 200～220                   |                    |
|                             | はつらつ君733〔7-3-3〕                                                                    |                           | ①②70～80<br>③④50～60 |

## ジュース用

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 160 kg

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 6  | － | 25  | － | 12 |
| (追肥)     | 6  | － | 0   | － | 6  |

| 施 肥 例                       | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                    |                         |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                        | 基肥 kg/10a               | 追肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料<br>＋りん酸              | BB ジュース用トマト専用046〔10(6.8)-14-16-Mg1〕<br>及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕                   | 100～120<br>20～30        | (6.8～8.1) |
| 緩効性基肥＋りん酸<br>＋<br>基肥時追肥成分施用 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 60～70<br>30～40<br>30～40 | (4.8～6.4) |

## ○土壌診断結果から適した BB 肥料の選定

| 土壌診断結果      | 施 肥 例  | 肥料名〔保証成分%〕 ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                          |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| おおむね基準値内    |        | 前記の各栽培型別施肥例のとおり                                                      |
| りん酸の多い土壌    | 基肥一発肥料 | BB 長期どりトマト838〔8(4)-3-8-Mg2〕 又は<br>BB 果菜用826〔8(5.6)-2-6-Mg2〕          |
|             | 有機基肥   | BB プレミア有機 433〔4-3-3〕 又は<br>BB 別格816〔8-1-6〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕 |
|             | 化成肥料   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                  |
| 加里の多い土壌     | 基肥一発肥料 | BB 果菜用822〔8(5.6)-2-2-Mg3〕                                            |
|             | 有機基肥   | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕                        |
| りん酸・加里の多い土壌 | 基肥一発肥料 | BB 果菜用822〔8(5.6)-2-2-Mg3〕                                            |

## 21 ピーマン

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 160 kg

| 栽培型 | 品種名       | 栽植様式                           | 作 型 模 式 図 |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |           |                                | 1月        | 2月     | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|     | 京 ゆ た か 鈴 | 200×45cm<br>2条(条間20)<br>2,200株 |           | ○<br>× |    | ①  | ②  | ③  |    |    |    |     |     | ○   |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 15 — 25 — 15

(追肥) 15 — 0 — 15

| 施 肥 例                | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                             |                  |             |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
|                      | 肥 料 名〔保証成分%〕                                 | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a   |
| 緩効性基肥<br>*<br>液肥追肥   | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                      | 140～150          |             |
|                      | まるとく液肥和み〔10-3-4〕                             |                  | ①～③50       |
| BB 基肥+りん酸<br>*<br>追肥 | BB-473号〔14-17-13〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 100～110<br>15～20 |             |
|                      | BB-NK606号〔16-0-16〕                           |                  | ①～③30～35    |
| 有機基肥<br>*<br>有機液肥追肥  | BB マックス有機666〔6-6-6〕                          | 240～260          |             |
|                      | はつらつ君733〔7-3-3〕                              |                  | ①～③70～80    |
| 基肥一発肥料               | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15-Mg1〕                | 190～210          | (14.2～15.7) |

# 野菜類（根菜類）

## 22 だいこん

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 60 kg

| 栽培型          | 品種名                | 栽植様式                        | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|              |                    |                             | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 春どり          | 役者紀行<br>春のいぶき<br>貴 | 60×30cm<br>5,500～<br>6,000株 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 夏どり<br>(高冷地) | 夏つかさ<br>春のいぶき      | 同上                          |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 秋冬どり         | 天寿<br>夏つかさ         | 70×30cm<br>5,000株           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 春どり

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 15 — 20 — 18

| 施肥例    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                               |                    |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|        | 肥料名〔保証成分%〕                                                                                     | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| 微量元素入り | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕又は<br>MMB 燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕 | 120～130<br>120～130 |           |
| BB 肥料  | BB-486号〔14-18-16〕                                                                              | 100～120            |           |
| 有機入り   | BB.S888号〔8-8-8-Mg2〕                                                                            | 180～200            |           |
| 有機質肥料  | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                            | 240～260            |           |
| 基肥一発肥料 | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                                                                    | 100～110            | (5.6～6.1) |

# 夏どり(高冷地)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 20  | － | 15 |
| (追肥)     | 3  | － | 0   | － | 3  |

| 施 肥 例                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                              |                    |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|                         | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                  | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a      |
| 微量元素入り<br>基肥<br>*<br>追肥 | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 又は<br>MMB 燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕 | 120～130<br>120～130 |                |
|                         | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                                           |                    | 15～20          |
| 基肥<br>*<br>追肥           | BB-S550号〔15-15-10〕 又は<br>燐硝安加里1号〔15-15-12〕                                                    | 90～110<br>90～110   |                |
|                         | BB-NK606号〔16-0-16〕 又は<br>燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                  |                    | 15～20<br>15～20 |
| 有機基肥 *<br>有機追肥          | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                           | 240～260            | 50             |
| 基肥一発肥料                  | BB ビール麦2号〔8(1.5)-18-16-Mg2〕                                                                   | 180～190            | (2.7～2.9)      |

# 秋冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 13 | － | 20  | － | 13 |
| (追肥)     | 3  | － | 0   | － | 3  |

| 施 肥 例                   | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                              |                    |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                         | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                  | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| 微量元素入り<br>基肥<br>*<br>追肥 | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 又は<br>MMB 燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕 | 100～110<br>100～110 |           |
|                         | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                                           |                    | 15～20     |
| 基肥<br>*<br>追肥           | BB-S550号〔15-15-10〕                                                                            | 80～90              |           |
|                         | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                                           |                    | 15～20     |
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥       | BB.S888号〔8-8-8〕                                                                               | 160～170            |           |
|                         | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                                           |                    | 15～20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥       | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                           | 210～220            | 50        |
| 基肥一発肥料                  | BB ビール麦2号〔8(1.5)-18-16-Mg2〕                                                                   | 190～210            | (2.8～3.1) |

## 23 かぶ

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 60 kg

| 栽培型           | 品種名 | 栽植様式               | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|-----|--------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|               |     |                    | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 春どり<br>(トンネル) | 白白  | 涼統<br>60cm<br>広幅播き | ○     | —  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   |
| 夏どり<br>(高冷地)  | 碧   | 同上又は<br>シードテープ     | —     | —  | —  | —  | ○  | ○  | —  | —  | —  | —   | —   | —   |

### 春どり(トンネル)

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 16 — 16 — 16

| 施肥例    | 肥料名〔保証成分%〕                         | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 微量要素入り | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕 | 130～140   |           |
| 有機入り肥料 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕             | 155～166   |           |
| 有機入り   | BB.S888号〔8-8-8〕                    | 190～210   |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                | 260～280   |           |

### 夏どり

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 15 — 15 — 15

| 施肥例    | 肥料名〔保証成分%〕                         | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 微量要素入り | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕 | 120～130   |           |
| 有機入り肥料 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕             | 145～155   |           |
| 有機入り   | BB.S888号〔8-8-8〕                    | 180～190   |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                | 240～260   |           |

## 24 にんじん

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,00 kg、苦土炭カル 80 kg(秋冬どりは 100kg)

| 栽培型                 | 品種名         | 栽植様式                                   | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                     |             |                                        | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 初夏どり<br>(トンネル)      | ヘータリッチ<br>彩 | 60 cm×12 cm<br>2条(条間12 cm)<br>28,000 株 |           | ○  | ○  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   |
| 秋冬どり<br>(加工用<br>含む) | 愛 紅         | 〃                                      | —         | —  | —  | —  | —  | —  | ○  | —  | ①  | —   | —   | —   |

### 初夏どり (トンネル)

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 15 — 22 — 15

| 施肥例   | 肥料名〔保証成分%〕                                                | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| BB 肥料 | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕 又は<br>BB-372〔13-17-12〕 | 120～130<br>110～120 |           |
| 有機入り  | BB.S888号〔8-8-8〕                                           | 180～190            |           |
| 有機肥料  | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                       | 240～260            |           |

### 秋冬どり (加工用含む)

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 10 — 22 — 10

(追肥) 3 — 0 — 3

| 施肥例                      | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                             |                |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                          | 肥料名〔保証成分%〕                                                   | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料                   | BB ビール麦2号〔8(1.5)-18-16-Mg2〕                                  | 150～170        | (2.2～2.5) |
| BB 基肥+りん<br>酸<br>*<br>追肥 | BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 80～90<br>20～25 |           |
|                          | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                          |                | 15～20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥        | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                          | 160～180        | 50        |

## 25 ごぼう

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型  | 品種名  | 栽植様式                 | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|------|----------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |      |                      | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏どり  | 柳川理想 | 60cm×10cm<br>16,700株 |           |    |    | ①  | ②  |    |    |    | ○  |     |     |     |
|      |      |                      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 秋冬どり | 柳川理想 | 〃                    |           |    | ○  |    | ①  | ②  |    |    |    |     |     |     |
|      |      |                      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | — | 40  | — | 12 |
| (追肥)     | 10 | — | 0   | — | 10 |

| 施肥例                      | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                           |                  |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                          | 肥料名〔保証成分%〕                                                 | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a   |
| 緩効性基肥<br>＋りん酸<br>＊<br>追肥 | CDU入りBB-S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕         | 80～90<br>75～85   |             |
|                          | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                        |                  | ①②30～35     |
| BB肥料＋りん酸<br>＊<br>追肥      | BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 90～110<br>60～70  |             |
|                          | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                        |                  | ①②30～35     |
| 化成＋りん酸<br>＊<br>追肥        | 燐硝安加里1号〔15-15-12〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕               | 75～85<br>70～80   |             |
|                          | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                        |                  | ①②30～35     |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥        | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                        | 190～210          | ①②80～90     |
| 基肥一発肥料<br>＋<br>りん酸       | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕    | 180～200<br>60～70 | (12.6～14.0) |

秋冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 17 | — | 40  | — | 17 |
| (追肥)     | 6  | — | 0   | — | 6  |

| 施 肥 例                    | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                           |                  |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                          | 肥 料 名〔保証成分%〕                                               | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a |
| 緩効性基肥<br>＋りん酸<br>＊<br>追肥 | CDU入り BB－S444号〔14-14-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕        | 120～130<br>60～70 |           |
|                          | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                        |                  | ①②15～20   |
| BB 肥料＋りん酸<br>＊<br>追肥     | BB－262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 140～150<br>50～60 |           |
|                          | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                        |                  | ①②15～20   |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥        | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                        | 280～300          | ①②50～60   |
| 基肥－発肥料<br>＋<br>りん酸       | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕     | 130～140<br>40～60 | (7.3～7.8) |

# 野菜類（葉茎菜類）

## 26 はくさい

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽培型           | 品種名            | 栽植様式              | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |        |     |     |     |
|---------------|----------------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|-----|-----|
|               |                |                   | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月     | 10月 | 11月 | 12月 |
| 秋どり<br>(早生)   | つくば            | 70×40cm<br>3,600株 |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ①<br>× | →   |     |     |
| 秋冬どり<br>(中晩生) | 黄ごころ<br>新理想    | 75×45cm<br>3,000株 |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ①<br>× | →   |     |     |
| 春どり<br>(トンネル) | 春さかり<br>クリーム2号 | 70×40cm<br>3,600株 | ○     | ○  | ○  | ×  | ×  | →  |    |    |        |     |     |     |

### 秋どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 17 | — | 25  | — | 17 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                            | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB-262 [12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2]                      | 135～145   |           |
|                   | 燐硝安加里S646号[16-4-16]                                   |           | 30～35     |
| 化成肥料<br>*<br>追肥   | MMB燐加安 A929 号(262 号)<br>[12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18] | 140～150   |           |
|                   | 燐硝安加里S646号[16-4-16]                                   |           | 30～35     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666 [6-6-6]                                  | 280～300   | 80～90     |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484 [14(5.6)-18-14]                          | 150～160   | (8.4～8.9) |

# 秋冬どり(中晩生)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 25  | － | 15 |
| (追肥)     | 5  | － | 0   | － | 5  |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>＊<br>追肥  | BB－262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕                       | 120～130   |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                   |           | 30～35     |
| 化成肥料<br>＊<br>追肥   | MMB燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕 | 120～130   |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                   |           | 30～35     |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 240～260   | 80～90     |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                           | 140～150   | (7.8～8.4) |

# 春どり(トンネル)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | － | 28  | － | 20 |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料  | BB－262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕                       | 160～170   |           |
| 化成肥料   | MMB燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕 | 160～170   |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 330～340   |           |
| 基肥一発肥料 | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                           | 140～150   | (7.8～8.4) |

## 27 キャベツ

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽培型  | 品種名     | 栽植様式              | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|---------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |         |                   | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 秋冬どり | 金系201山楽 | 70×40cm<br>3,600株 |       |    |    |    |    |    | ○  | ×  |    | ①   |     |     |
|      |         |                   |       |    |    |    |    |    | ○  | ×  |    | ①   |     |     |
| 春どり  | 金系201   | 75×35cm<br>4,100株 |       |    | ②  |    |    |    |    |    |    | ○   | ×   | ①   |
| 夏どり  | 若峰      | 70×35cm<br>4,100株 |       | ○  | ×  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 秋冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 16 | — | 25  | — | 20 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                          |                    |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                                | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a   |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB-262 [12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2] 又は<br>BB-286号 [12-18-16] | 130～140<br>130～140 |             |
|                   | 燐硝安加里S646号[16-4-16]                                       |                    | 30～35       |
| 化成肥料<br>*<br>追肥   | MMB燐加安 A929 号(262 号)<br>[12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18]     | 130～140            |             |
|                   | 燐硝安加里S646号[16-4-16]                                       |                    | 30～35       |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666 [6-6-6]                                      | 260～300            | 80～90       |
| 基肥一発肥料            | BB 玉ねぎ464 [14(9.8)-16-14]                                 | 140～160            | (13.7～15.6) |

## 春どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 25  | － | 15 |
| (追肥)     | 6  | － | 0   | － | 6  |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                        |                    |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                            | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB－262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 又は<br>BB－286号〔12-18-16〕 | 120～130<br>120～130 |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                     |                    | ①②15～25   |
| 化成肥料<br>*<br>追肥   | MMB燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕   | 120～130            |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                     |                    | ①②15～25   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                     | 240～260            | ①②50～60   |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                             | 140～160            | (7.8～8.9) |

## 夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 25  | － | 15 |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                        |                    |           |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                                            | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料  | BB－262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 又は<br>BB－286号〔12-18-16〕 | 120～130<br>120～130 |           |
| 化成肥料   | MMB燐加安 A929 号(262 号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕   | 120～130            |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                     | 240～260            |           |
| 基肥一発肥料 | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                             | 100～120            | (5.6～6.7) |

## 28 こまつな

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,500 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型 | 品種名 | 栽植様式       | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----|------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |     |            | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 秋どり | さおり | 60cm<br>広幅 |       |    |    |    |    |    |    |    | ○  | —   | □   |     |
| 冬どり | さおり | 60cm<br>広幅 | □     |    |    |    |    |    |    |    |    | ○   | —   | □   |

### 秋どり・冬どり

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 20 — 15 — 15

| 施肥例    | 肥料名〔保証成分%〕                                 | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 有機入り肥料 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕                     | 190～210   |           |
| 化成肥料   | 燐硝安加里1号〔15-15-12〕                          | 130～140   |           |
|        | 又は<br>苦土ホウ素入硝磷加安 S444号〔14-14-14-Mg4-B0.15〕 | 140～150   |           |
|        | 又は<br>ホウソ入化成高度35号〔12-10-12-Mg3-B0.2〕       | 160～170   |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                        | 320～360   |           |

## 29 ほうれんそう

適正 pH6.5～7.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 160～200 kg

| 栽培型             | 品種名                           | 栽植様式          | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                 |                               |               | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 高冷地夏どり<br>(雨よけ) | 晩抽サンホフ・<br>ジョーカーセブン<br>フ・ライトン | 畦幅60cm<br>多条播 |           |    |    |    | ①  |    |    |    |    | ①   |     |     |
| 秋どり             | ミラーシ・<br>ハンター<br>カッシーニ        | 同 上           |           |    |    |    |    |    |    |    |    | ①   |     |     |
| 冬春どり            | 東 栄 7<br>ハンター                 | 60cm<br>広幅    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ①   |     |

高冷地夏どり(雨よけ栽培)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 18  | — | 15 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 0  |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                      |                    |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                          | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕<br>又は<br>BB-473号〔14-17-13〕                                            | 120～130<br>100～110 |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                                            |                    | 15～20     |
| 化成肥料<br>*<br>追肥   | MMB磷加安 A929 号(262号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕<br>又は<br>苦土ホウ素入硝磷加安S444<br>〔14-14-14-Mg4-B 0.15〕 | 120～130<br>100～110 |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                                            |                    | 15～20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                                   | 240～260            | 50        |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                                                                           | 120～130            | (6.7～7.2) |

# 秋どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 14 | — | 16  | — | 14 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 0  |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                |                         |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                    | 基肥 kg/10a               | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕<br>BB-473号〔14-17-13〕                                            | 又は<br>110~120<br>90~100 |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                                      |                         | 15~20     |
| 化成肥料<br>*<br>追肥   | MMB磷加安 A929 号(262号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕<br>苦土ホウ素入硝磷加安S444<br>〔14-14-14-Mg4-B 0.15〕 | 又は<br>110~120<br>95~105 |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                                      |                         | 15~20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                             | 240~260                 | 50~60     |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                                                                     | 90~110                  | (6.7~7.2) |

# 冬春どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 18  | — | 15 |
| (追肥)     | 6  | — | 0   | — | 0  |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                                |                          |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                    | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕<br>BB-473号〔14-17-13〕                                            | 又は<br>120~130<br>100~110 |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                                      |                          | ①②10~15   |
| 化成肥料<br>*<br>追肥   | MMB磷加安 A929 号(262号)<br>〔12-16-12-Mg5-Mn 0.38-B 0.18〕<br>苦土ホウ素入硝磷加安S444<br>〔14-14-14-Mg4-B 0.15〕 | 又は<br>120~130<br>100~110 |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕                                                                                      |                          | ①②15~20   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                             | 240~260                  | ①②60~80   |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                                                                     | 140~160                  | (7.8~8.9) |

### 30 ね ぎ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,500 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽 培 型  | 品 種 名            | 栽植様式               | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------|------------------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|        |                  |                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏 どり   | 夏 扇ハ°ラー<br>羽緑一本太 | 90×3 cm<br>37,000株 | ○         | ○  |    |    | ×  | ①  | ②  |    |    |     |     |     |
|        |                  |                    |           |    | ×  | ①  | ②  |    |    |    | ○  | ○   |     | ×   |
| 秋 冬 どり | 関羽一本太<br>夏 扇 3 号 |                    |           |    | ○  | ○  | ×  | ×  | ①  | ②  | ③  |     |     |     |
|        |                  |                    |           |    |    | ×  | ×  | ①  | ②  | ③  | ○  | ○   |     |     |

#### 夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | — | 10  | — | 8  |
| (追肥)     | 10 | — | 10  | — | 8  |

| 施 肥 例                        | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                           |                                     |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                              | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                               | 基肥 kg/10a                           | 追肥 kg/10a        |
| 基肥一発肥料                       | BB ねぎ専用S555号〔15(9)-15-15〕                                                  | 80～100                              | (7.2～9.0)        |
| 緩効性基肥<br>+<br>りん酸<br>*<br>追肥 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 又は<br>及び<br>30～40<br>30～35<br>10～20 | ①30～40<br>①30～35 |
|                              | 硫安〔21-0-0〕                                                                 |                                     | ②20～25           |
| BB 肥料<br>*<br>追肥             | BB-286号〔12-18-16〕                                                          | 40～45                               | ①40～45           |
|                              | 硫安〔21-0-0〕                                                                 |                                     | ②20～25           |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥            | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                        | 80～100                              | ①②80～100         |

# 秋冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | － | 10  | － | 8  |
| (追肥)     | 15 | － | 10  | － | 8  |

| 施 肥 例                        | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                           |                                     |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                              | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                               | 基肥 kg/10a                           | 追肥 kg/10a        |
| 基肥一発肥料                       | BB ねぎ専用S555号〔15(9)–15–15〕                                                  | 100～120                             | (9～10.8)         |
| 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸<br>＊<br>追肥 | CDU入 BB－S444号〔14–14–14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15–15–15〕<br>苦土重焼燐〔0–35–0–Mg 4.5〕 | 又は<br>及び<br>30～40<br>30～35<br>10～20 | ①30～40<br>①30～35 |
|                              | 硫安〔21–0–0〕                                                                 |                                     | ②③20～25          |
| BB 肥料<br>＊<br>追肥             | BB－286号〔12–18–16〕                                                          | 40～45                               | ①40～45           |
|                              | 硫安〔21–0–0〕                                                                 |                                     | ②③20～25          |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥            | BB マックス有機666〔6–6–6〕                                                        | 80～100                              | ①②③80～100        |

## 3 1 らっきょう

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 800 kg、苦土炭カル 40 kg

| 栽 培 型   | 品 種 名 | 栽植様式               | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|-------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|         |       |                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普 通 栽 培 | ら く だ | 60×7 cm<br>24,000株 |           |    |    | ②  |    |    |    |    | ○  |     | ①   |     |

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 6  | － | 10  | － | 10 |
| (追肥)     | 6  | － | 0   | － | 0  |

| 施 肥 例                           | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                           |                                     |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                                 | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                               | 基肥 kg/10a                           | 追肥 kg/10a |
| 基肥＋追肥                           | BB－286号〔12–18–16〕                                                          | 45～55                               |           |
|                                 | 硫安〔21–0–0〕                                                                 |                                     | ①②15～20   |
| 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸・加里<br>＊<br>追肥 | CDU入 BB－S444号〔14–14–14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15–15–15〕<br>PK化成40号〔0–20–20–Mg4〕 | 又は<br>及び<br>60～70<br>50～60<br>10～20 |           |
|                                 | 硫安〔21–0–0〕                                                                 |                                     | ②15～20    |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥               | BB マックス有機666〔6–6–6〕                                                        | 100～110                             | ①②50～60   |
| 基肥一発肥料                          | BB 玉ねぎ464〔14(9.8)–16–14〕                                                   | 60～80                               | (5.7～7.6) |

### 32 たまねぎ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 160 kg

| 栽培型           | 品種名                            | 栽植様式                                 | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|               |                                |                                      | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 秋まき<br>(水田裏作) | アドバンス<br>甘ー70<br>ソニック<br>もみじ3号 | 60×12cm<br>2条<br>(条間12cm)<br>28,000株 |       | ②  |    |    |    |    |    |    | ○  | ○   | ×   | ①   |

#### 秋まき(水田裏作)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | — | 22  | — | 12 |
| (追肥)     | 10 | — | 5   | — | 10 |

| 施肥例                         | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                     |                                        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                             | 肥料名〔保証成分%〕                                                           | 基肥 kg/10a                              | 追肥 kg/10a        |
| 基肥一発肥料                      | BB 玉ねぎ464〔14(9.8)-16-14〕                                             | 120～140                                | (11.7～13.7)      |
| BB 肥料+りん酸<br>*<br>追肥        | BB-473号〔14-17-13〕<br>CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 又は<br>及び<br>80～100<br>100～120<br>20～40 | ①30～40<br>①30～40 |
|                             | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                  |                                        | ②30～40           |
| 化成肥料<br>+<br>りん酸<br>*<br>追肥 | オール14〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕   | 又は<br>及び<br>80～90<br>90～100<br>20～40   | ①30～40<br>①30～40 |
|                             | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                  |                                        | ②30～40           |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥           | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                  | 200～220                                | ①②80～90          |

### 33 に ら

適正 pH6.0～7.0、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽 培 型   | 品 種 名                                         | 栽植様式              | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|         |                                               |                   | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏 ど り   | ハワフルグリーン<br>ヘルト                               | 45×25cm<br>8,800株 | 1年株       |    | ○  |    |    |    | ×  | ×  |    | ①   | ②   |     |
|         |                                               |                   | 2年株       | □  |    |    |    | ③  |    |    |    |     |     |     |
| 冬 ど り   | ミラクルグリーン<br>ヘルト<br>ワンターグリーン<br>ヘルト<br>タフホーイ   |                   | 1年株       |    | ○  |    |    | ×  |    |    | ①  | ②   | □   |     |
|         |                                               |                   |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 連 続 ど り | ミラクルグリーン<br>ヘルト<br>グリーンロート<br>ワンターグリーン<br>ヘルト |                   | 1年株       |    | ○  |    |    |    | ×  | ×  |    | ①   | ②   | □   |
|         |                                               |                   |           | ③  |    |    | ④  |    | ⑤  |    |    |     |     |     |

注 ◀▶ の点線 にらグリーン 実線 にら男爵 太線 みどり姫

#### 夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 30  | — | 15 |
| (追肥)     | 15 | — | 0   | — | 15 |

| 施肥例                                | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                               |                              |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                    | 肥料名〔保証成分%〕                                                                     | 基肥 kg/10a                    | 追肥 kg/10a                  |
| 基肥一発肥料<br>+<br>りん酸+加里<br>*<br>後期追肥 | BB にらグリーン886〔8(4.7)–8–6–Mg3〕 又は<br>BB にら男爵〔20(13)–6–10〕                        | 280～300<br>120～130           | (13.2～14.1)<br>(15.6～16.9) |
|                                    | 及び 苦土重焼燐〔0–35–0–Mg 4.5〕                                                        | 10～20(グリーンでは)<br>45～50(男爵では) |                            |
|                                    | 及び 硫酸加里〔0–0–50〕                                                                | 10～15(グリーンでは)<br>20～25(男爵では) |                            |
|                                    | BBNew 野菜追肥S105〔10–2–15–Mg3〕                                                    |                              | ③45～55                     |
| BB 緩効基肥<br>+りん酸<br>*<br>追肥         | CDU入 BB–S444号〔14–14–14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0–35–0–Mg 4.5〕                             | 100～110<br>45～50             |                            |
|                                    | BBNew 野菜追肥S105〔10–2–15–Mg3〕                                                    |                              | ①②③45～55                   |
| 緩効性基肥<br>+<br>りん酸<br>*<br>有機液肥追肥   | CDU燐加安S555たまご〔15–15–15〕 又は<br>IB化成S1号〔10–10–10–Mg1〕 及び<br>苦土重焼燐〔0–35–0–Mg 4.5〕 | 80～100<br>130～150<br>45～50   |                            |
|                                    | はつらつ君733〔7–3–3〕                                                                |                              | ①②③70～80                   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥                  | BB マックス有機666〔6–6–6〕                                                            | 240～260                      | ①②③80～90                   |

# 冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | － | 30  | － | 20 |
| (追肥)     | 10 | － | 0   | － | 10 |

| 施 肥 例                            | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                         |          |                             |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
|                                  | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                             |          | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a   |
| 基肥一発肥料<br>＋<br>りん酸＋加里            | BB にら男爵〔20(13)－6－10〕<br>苦土重焼燐〔0－35－0－Mg 4.5〕<br>硫酸加里〔0－0－50〕             | 及び<br>及び | 120～140<br>60～65<br>30～35   | (15.6～18.2) |
| BB 緩効基肥<br>＋<br>りん酸<br>＊<br>追肥   | CDU入 BB－S444号〔14－14－14〕<br>苦土重焼燐〔0－35－0－Mg 4.5〕                          | 及び       | 140～150<br>20～30            |             |
|                                  | BBNew 野菜追肥S105〔10－2－15－Mg3〕                                              |          |                             | ①②45～55     |
| 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸<br>＊<br>有機液肥追肥 | CDU燐加安S555たまご〔15－15－15〕<br>IB化成S1号〔10－10－10－Mg1〕<br>苦土重焼燐〔0－35－0－Mg 4.5〕 | 又は<br>及び | 130～140<br>180～200<br>20～30 |             |
|                                  | はつらつ君733〔7－3－3〕                                                          |          |                             | ①②70～80     |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥                | BB マックス有機666〔6－6－6〕                                                      |          | 320～360                     | ①②80～90     |

# 連続どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | － | 30  | － | 20 |
| (追肥)     | 22 | － | 0   | － | 22 |

| 施 肥 例                                      | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                         |          |                             |                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|
|                                            | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                             |          | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a              |
| 基肥一発肥料<br>＋<br>りん酸＋加里<br>＋<br>捨刈時追肥        | BB にら男爵〔20(13)－6－10〕<br>苦土重焼燐〔0－35－0－Mg 4.5〕<br>硫酸加里〔0－0－50〕             | 及び<br>及び | 120～140<br>50～60<br>25～30   | (15.6～18.2)            |
|                                            | BB みどり姫〔22(17)－2－15〕                                                     |          |                             | ③④⑤45～60<br>(7.7～10.2) |
| BB 緩効基肥<br>＋りん酸<br>＊<br>液肥追肥<br>＋<br>捨刈時追肥 | CDU入 BB－S444号〔14－14－14〕<br>苦土重焼燐〔0－35－0－Mg 4.5〕                          | 及び       | 130～140<br>20～30            |                        |
|                                            | はつらつ君733〔7－3－3〕                                                          |          |                             | ①②70～80                |
|                                            | BB みどり姫〔22(17)－2－15〕                                                     |          |                             | ③④⑤45～60<br>(7.7～10.2) |
| 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸<br>＊<br>有機液肥追肥           | CDU燐加安S555たまご〔15－15－15〕<br>IB化成S1号〔10－10－10－Mg1〕<br>苦土重焼燐〔0－35－0－Mg 4.5〕 | 又は       | 130～140<br>180～200<br>20～30 |                        |
|                                            | はつらつ君733〔7－3－3〕                                                          |          |                             | ①②70～80<br>③④⑤40～50    |
| 有機基肥<br>＊<br>有機追肥                          | BB マックス有機666〔6－6－6〕                                                      |          | 320～360                     | ①②80～90<br>③④⑤50～60    |

○土壌診断結果から適した BB 肥料の選定(冬どり)

| 土壌診断結果      | 施 肥 例  | 肥 料 名〔保証成分%〕( )内は被覆肥料からの窒素成分                                         |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| おおむね基準値内    |        | 前記の各栽培型別施肥例のとおり                                                      |
| りん酸の多い土壌    | 基肥一発肥料 | BB にら男爵〔20(13)-6-10〕 又は<br>BB 果菜用826〔8(5)-2-6-Mg2〕                   |
|             | 有機基肥   | BB プレミア有機 433〔4-3-3〕 又は<br>BB 別格816〔8-1-6〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕 |
|             | 化成肥料   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                  |
| 加里の多い土壌     | 基肥一発肥料 | BB 果菜用822〔8(5)-2-2-Mg3〕                                              |
|             | 有機基肥   | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕                        |
| りん酸・加里の多い土壌 | 基肥一発肥料 | BB 果菜用822〔8(5)-2-2-Mg3〕                                              |
|             | 有機基肥   | BB プレミア有機433〔4-3-3〕 又は<br>BB マックス有機833〔8-3-3〕                        |

### 34 にんにく

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 40 kg

| 栽培型  | 品種名 | 栽植様式               | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-----|--------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |     |                    | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普通栽培 | 六片種 | 30×12cm<br>23,800株 |       |    | ①  | ②  |    |    |    |    | ○  |     |     |     |

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 8  | — | 12  | — | 8  |
| (追肥)     | 6  | — | 0   | — | 6  |

| 施肥例              | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |                |           |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                  | 肥料名〔保証成分%〕                                            | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 50～60<br>50～60 |           |
|                  | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                   |                | ①②15～20   |
| 有機基肥 *<br>有機追肥   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 120～140        | ①②50～60   |
| 基肥一発肥料           | BB 玉ねぎ464〔15(9.8)-15-15〕                              | 80～100         | (7.6～9.5) |

### 35 しょうが

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型  | 品種名 | 栽植様式              | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-----|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |     |                   | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地早出 | 三州太 | 60×30cm<br>5,600株 |       |    |    |    | ×  | ①  | ②  |    |    |     |     |     |

露地早出

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 14 | — | 25  | — | 12 |
| (追肥)     | 10 | — | 0   | — | 10 |

| 施肥例                  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                             |                 |            |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|
|                      | 肥料名〔保証成分%〕                                   | 基肥 kg/10a       | 追肥 kg/10a  |
| BB 基肥+りん酸<br>*<br>追肥 | BB-473号〔14-17-13〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 90～110<br>20～30 |            |
|                      | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                          |                 | ①②30～40    |
| 有機基肥 *<br>有機追肥       | BB マックス有機666〔6-6-6〕                          | 220～240         | ①②80～90    |
| 基肥一発肥料               | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15-Mg1〕                | 130～150         | (9.8～11.3) |

### 36 みょうが

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型  | 品種名          | 栽植様式              | 作 型 模 式 図 |       |                |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|--------------|-------------------|-----------|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |              |                   | 1月        | 2月    | 3月             | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普通栽培 | 在 来 系<br>赤 城 | 60×18cm<br>9,300株 |           |       | 1年目<br>×.....× |    |    | ①  |    |    |    |     |     |     |
|      |              |                   |           | 2年目以降 |                |    |    | ①  |    |    |    |     |     |     |

|     |          |    |   |     |   |    |
|-----|----------|----|---|-----|---|----|
|     |          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 1年目 | 施肥基準(基肥) | 14 | — | 18  | — | 16 |
|     | (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 3  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                |                    |           |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                      | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | BB.S888号〔8-8-8-Mg2〕<br>又は<br>栃木そさい新2号〔11-10-10〕 | 160～180<br>120～130 |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                             |                    | 15～25     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                             | 240～260            | 40～60     |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                     | 90～100             | (5.0～5.6) |

#### 2年目以降

| 施肥例 | 肥料名〔保証成分%〕          | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-----|---------------------|-----------|-----------|
| 追肥  | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕 |           | 15～25     |
|     | BB マックス有機666〔6-6-6〕 |           | 40～60     |

### 37 う ど

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 60 kg

| 栽培型 | 品種名                                | 栽植様式               | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                                    |                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|     | 紫<br>柄木芳香1<br>号<br>紫<br>柄木芳香2<br>号 | 150×60cm<br>1,100株 |           |    | ×  | ×  | ①  |    | ②  |    |    |     | 掘上  | 軟化  |

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 8  | — | 20  | — | 10 |
| (追肥)     | 4  | — | 0   | — | 4  |

| 施 肥 例              | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                          |                |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                    | 肥 料 名〔保証成分%〕                                              | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| 基肥—発肥料<br>+<br>りん酸 | BB うど専用555号〔15(7.5)–15–15–Mg1〕 及び<br>苦土重焼燐〔0–35–0–Mg 4.5〕 | 60～80<br>20～30 | (4.5～6.0) |
| 基肥+りん酸<br>*<br>追肥  | BB–286号〔12–18–16〕 及び<br>苦土重焼燐〔0–35–0–Mg 4.5〕              | 60～70<br>20～30 |           |
|                    | 燐硝安加里S646号〔16–4–16〕                                       |                | ①②10～15   |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥  | BB マックス有機666〔6–6–6〕                                       | 120～140        | ①②30～40   |

### 38 みつば

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型  | 品種名  | 栽植様式       | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|------|------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |      |            | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 軟化栽培 | 柳川2号 | 75cm<br>散播 |           |    |    |    | ○  | ①  |    |    |    |     |     |     |
|      |      |            |           |    |    |    |    | ←  |    | →  |    |     | 掘上  | 軟化  |
|      |      |            |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

#### 軟化栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 16  | — | 10 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 3  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                        |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                              | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| 緩効性基肥             | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕   | 80～90<br>80～90 |           |
| BB 肥料<br>*<br>追肥  | BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕 又は<br>BB-473号〔14-17-13〕 | 80～90<br>70～80 |           |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                     |                | 15～20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                     | 160～180        | 50～60     |
| 基肥一発肥料            | BB うど専用555〔15(7.5)-15-15-Mg1〕                           | 80～90          | (6.0～6.8) |

### 39 しゅんぎく

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型  | 品種名                              | 栽植様式       | 作型模形式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|----------------------------------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |                                  |            | 1月     | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏秋どり | きわめ中葉<br>さとあきら<br>さとゆたか<br>おきく3号 | 60cm<br>広幅 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 秋冬どり |                                  | 60cm<br>広幅 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

#### 夏秋どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | — | 15  | — | 10 |
| (追肥)     | 4  | — | 0   | — | 4  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                             |                                |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                                                   | 基肥 kg/10a                      | 追肥 kg/10a |
| 基肥<br>*<br>追肥     | BB-S550号〔15-15-10〕<br>BB-262〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕<br>燐硝安加里1号〔15-15-12〕 | 又は<br>75～85<br>90～110<br>75～85 |           |
|                   | BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕                                                 |                                | 35～45     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                          | 200～220                        | 60～70     |
| 基肥一発肥料            | BB 春菊専用O24〔10(4)-2-4-Mg2〕<br>(不足する成分は補充)                                     | 120～140                        | (4.8～5.6) |

#### 秋冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 16 | — | 25  | — | 16 |
| (追肥)     | 9  | — | 0   | — | 9  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                         |           |           |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                               | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥  | BB-473号〔14-17-13〕                        | 100～120   |           |
|                   | BBNew 野菜追肥S105〔10-2-15-Mg3〕              |           | ①②③30～40  |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                      | 260～300   | ①②③50～60  |
| 基肥一発肥料            | BB 春菊専用O24〔10(4)-2-4-Mg2〕<br>(不足する成分は補充) | 200～220   | (8～8.8)   |

## 40 カリフラワー

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽培型  | 品種名         | 栽植様式              | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |             |                   | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 初秋どり | スノウ<br>クラウン | 70×40cm<br>3,600株 |           |    |    |    |    | ○  | ×  | ①  | →  |     |     |     |
| 秋どり  | 白<br>翠      | 70×45cm<br>3,200株 |           |    |    |    |    | ○  | ×  | ①  | →  |     |     |     |

### 初秋・秋どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | — | 25  | — | 20 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施肥例                         | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                         |                    |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                             | 肥料名〔保証成分%〕                                               | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料<br>*<br>追肥            | BB-262 [12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2] 又は<br>BB-473 [14-17-13] | 160～170<br>130～150 |           |
|                             | 燐硝安加里S646号[16-4-16]                                      |                    | 30～40     |
| 緩効性基肥                       | CDU入 BB-S444号 [14-14-14] 又は<br>CDU燐加安S555たまご [15-15-15]  | 150～170<br>140～160 |           |
| 化成肥料<br>+<br>りん酸<br>*<br>追肥 | 燐硝安加里1号 [15-15-12] 及び<br>苦土重焼燐 [0-35-0-Mg 4.5]           | 130～140<br>10～20   |           |
|                             | 燐硝安加里S646号 [16-4-16]                                     |                    | 30～40     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥           | BB マックス有機666 [6-6-6]                                     | 320～360            | 80～90     |
| 基肥一発肥料                      | BB ぐんぐん野菜484 [14(5.6)-18-14]                             | 140～150            | (7.8～8.4) |

## 4 1 ブロッコリー

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型  | 品種名         | 栽植様式                          | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-------------|-------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |             |                               | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 春夏どり | おはようピクセル玉   | 60～75×45～60cm<br>2,800～3,000株 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 秋冬どり | ピクセルおはようしげ玉 |                               |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 春夏・秋冬どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 14 | — | 25  | — | 14 |
| (追肥)     | 8  | — | 0   | — | 8  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                              |           |                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                                                    | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a                   |
| 基肥＋りん酸<br>＊<br>追肥 | BB－262〔12-16-12-Mg1-Mn 0.5-B 0.2〕<br>BB－473〔14-17-13〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 又は<br>及び  | 110～120<br>90～110<br>20～40  |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                           |           | ①②20～30                     |
| 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸 | CDU入BB－S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕     | 又は<br>及び  | 140～150<br>130～140<br>20～40 |
| 有機肥料<br>＊<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                           | 230～240   | ①②60～70                     |
| 基肥一発肥料            | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕                                                   | 130～150   | (7.3～8.4)                   |

## 42 レタス

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型  | 品種名                                     | 栽植様式                     | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |                                         |                          | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 秋冬どり | エクシード<br>からさわ<br>ハトリオット<br>トリガー<br>ステディ | 120×30cm<br>5条<br>7,000株 |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ×  | ○   | ×   | ○   |
| 春どり  | ステディ<br>トリガー<br>クールガイ                   | 120×30cm<br>4条<br>6,000株 | ○     | ×  | ○  | ×  | ○  | ×  | ○  | ×  | ○  | ×   | ○   | ×   |

秋冬・春どり

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 15 — 20 — 15

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕                                                                          | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 基肥                | BB-262 [12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2] 又は<br>BB-473 [14-17-13]                            | 120～130<br>100～120       |           |
| 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸 | CDU入 BB-S444号 [14-14-14] 又は<br>CDU燐加安S555たまご [15-15-15] 及び<br>苦土重焼燐 [0-35-0-Mg 4.5] | 90～100<br>80～90<br>10～20 |           |
| 有機肥料              | BB マックス有機666 [6-6-6]                                                                | 240～260                  |           |

### 4 3 アスパラガス

(初 年 度) 適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 200 kg、ようりん 200 kg

(2年目以降) 適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 160 kg

| 栽 培 型                  | 品 種 名 | 栽植様式               | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                        |       |                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ハ ウ ス                  | ウェルカム | 150×30cm<br>2,000株 | 初年度       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    |           | ○  |    |    | ⌘  | ①  | ②  | ③  | ④  | ⑤   |     |     |
|                        |       |                    |           |    |    |    | ×  |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    | 2 年 目     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    |           | ⌘  |    | ①  |    | ②  | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦   | ⌘   |
| ハウス長期どり<br>(ウォーターカーテン) | ウェルカム | 150×30cm<br>2,000株 | 初年度       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    |           | ○  |    |    | ⌘  | ①  | ②  | ③  | ④  | ⑤   |     |     |
|                        |       |                    |           |    |    |    | ×  |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    | 2 年 目     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    |           | ⌘  |    | ①  |    | ②  | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦   |     |
| ハウス長期どり<br>(ウォーターカーテン) | ウェルカム | 150×30cm<br>2,000株 | 3 年 目     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    |           | ⌘  |    | ①  |    | ②  | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦   |     |
|                        |       |                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    | 4 年 目 以 降 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                        |       |                    |           | ⌘  |    |    | ①  | ②  | ③  | ④  | ⑤  | ⑥   | ⑦   |     |

ハウス・ハウス長期どり  
初年度

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | － | 14  | － | 10 |
| (追肥①③⑤)  | 9  | － | 0   | － | 9  |
| (追肥②④)   | 6  | － | 6   | － | 6  |

| 施 肥 例          | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                    |
|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
|                | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a          |
| BB 肥料基肥＋<br>追肥 | BB アスパラリッチ〔7-4.3-3.6〕            | 120～160   |                    |
|                | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕              |           | ①③⑤15～25           |
|                | BB オール14〔14-14-14〕               |           | ②④20～25            |
| 有機肥料＋<br>有機追肥  | BB マックス有機666〔6-6-6〕              | 160～180   |                    |
|                | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ①②③④⑤50～60         |
| 基肥一発肥料         | BB アスパラガス専用522〔15(12)-12-12-Mg2〕 | 120～140   | ①～⑤<br>(14.4～16.8) |

ハウス・ハウス長期どり  
2年目

|           |    |   |     |   |    |
|-----------|----|---|-----|---|----|
|           | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(追肥①) | 16 | － | 20  | － | 12 |
| (追肥②④⑥)   | 9  | － | 0   | － | 9  |
| (追肥③⑤⑦)   | 9  | － | 9   | － | 9  |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                           |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a                 |
| BB 肥料  | BB アスパラリッチ〔7-4.3-3.6〕            |           | ①200～240                  |
|        | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕              |           | ②④⑥15～25                  |
|        | BB オール14〔14-14-14〕               |           | ③⑤⑦20～25                  |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ①260～280                  |
|        | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ②③④⑤⑥⑦<br>50～60           |
| 追肥一発肥料 | BB アスパラガス専用522〔15(12)-12-12-Mg2〕 |           | ①～⑦160～180<br>(19.2～21.6) |

ハウス  
3年目

|           |    |   |     |   |    |
|-----------|----|---|-----|---|----|
|           | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(追肥①) | 18 | － | 22  | － | 14 |
| (追肥②④⑥)   | 9  | － | 0   | － | 9  |
| (追肥③⑤⑦)   | 9  | － | 9   | － | 9  |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                         |
|--------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a               |
| BB 肥料  | BB アスパラリッチ〔7-4.3-3.6〕            |           | ①220～260                |
|        | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕              |           | ②④⑥15～25                |
|        | BB オール14〔14-14-14〕               |           | ③⑤⑦20～25                |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ①300～320                |
|        | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ②③④⑤⑥⑦<br>50～60         |
| 追肥一発肥料 | BB アスパラガス専用522〔15(12)-12-12-Mg2〕 |           | ①～⑦200～220<br>(24～26.4) |

ハウス  
4年目以降

|           | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
|-----------|----|---|-----|---|----|
| 施肥基準(追肥①) | 20 | － | 24  | － | 17 |
| (追肥②④⑥)   | 9  | － | 0   | － | 9  |
| (追肥③⑤⑦)   | 9  | － | 9   | － | 9  |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                           |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a                 |
| BB 肥料  | BB アスパラリッチ〔7-4.3-3.6〕            |           | ①280～300                  |
|        | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕              |           | ②④⑥15～20                  |
|        | BB オール14〔14-14-14〕               |           | ③⑤⑦20～25                  |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ①320～340                  |
|        | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ②③④⑤⑥⑦<br>50～60           |
| 追肥一発肥料 | BB アスパラガス専用522〔15(12)-12-12-Mg2〕 |           | ①～⑦240～260<br>(28.8～31.2) |

ハウス長期どり  
3年目

|           | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
|-----------|----|---|-----|---|----|
| 施肥基準(追肥①) | 18 | － | 22  | － | 14 |
| (追肥②④⑥⑧)  | 12 | － | 0   | － | 12 |
| (追肥③⑤⑦)   | 9  | － | 9   | － | 9  |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                           |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a                 |
| BB 肥料  | BB アスパラリッチ〔7-4.3-3.6〕            |           | ①240～280                  |
|        | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕              |           | ②④⑥⑧15～25                 |
|        | BB オール14〔14-14-14〕               |           | ③⑤⑦20～25                  |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ①300～320                  |
|        | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ②③④⑤⑥⑦⑧<br>50～60          |
| 追肥一発肥料 | BB アスパラガス専用522〔15(12)-12-12-Mg2〕 |           | ①～⑧240～260<br>(28.8～31.2) |

ハウス長期どり  
4年目以降

|           | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
|-----------|----|---|-----|---|----|
| 施肥基準(追肥①) | 20 | － | 24  | － | 17 |
| (追肥②④⑥⑧)  | 12 | － | 0   | － | 12 |
| (追肥③⑤⑦)   | 9  | － | 9   | － | 9  |

| 施 肥 例  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                 |           |                           |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|        | 肥 料 名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a                 |
| BB 肥料  | BB アスパラリッチ〔7-4.3-3.6〕            |           | ①260～300                  |
|        | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕              |           | ②④⑥⑧15～25                 |
|        | BB オール14〔14-14-14〕               |           | ③⑤⑦20～25                  |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ①320～340                  |
|        | BB マックス有機666〔6-6-6〕              |           | ②③④⑤⑥⑦⑧<br>50～60          |
| 追肥一発肥料 | BB アスパラガス専用522〔15(12)-12-12-Mg2〕 |           | ①～⑧260～280<br>(31.2～33.6) |

## 4 4 モロヘイヤ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽培型   | 品種名 | 栽植様式                                   | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-----|----------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |     |                                        | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ハウス栽培 |     | 60～70 × 30～40cm<br>3～4条<br>4,000株      |           |    | ○  | ×  | ①  | ②  | ③  | ④  | ⑤  |     | ○   |     |
| 露地栽培  |     | 80～100 × 40～60cm<br>2条<br>2,500～3,000株 |           |    | ○  | ×  | ①  | ②  | ③  |    |    |     |     |     |

### ハウス栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 18 | — | 26  | — | 20 |
| (追肥)     | 10 | — | 0   | — | 10 |

| 施 肥 例          | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                |                  |             |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                | 肥 料 名〔保証成分%〕                                    | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a   |
| 緩効基肥<br>* 追肥   | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                         | 140～150          |             |
|                | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                             |                  | ②～⑤ 10～15   |
| BB 肥料<br>* 追肥  | BB-286号〔12-18-16〕                               | 140～150          |             |
|                | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                             |                  | ①～⑤ 10～15   |
| 有機基肥 *<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                             | 300～320          | ①～⑤ 30～40   |
| 基肥一発肥料<br>+加里  | BB 苦土入りなす006〔10(7)-10-6-Mg5〕 及び<br>硫酸加里〔0-0-50〕 | 230～250<br>20～25 | (16.1～17.5) |

### 露地栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 23 | — | 15  | — | 15 |
| (追肥)     | 12 | — | 0   | — | 12 |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                          |                  |                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                                              | 基肥 kg/10a        | 追肥 kg/10a              |
| 緩効基肥 * 追肥         | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                                   | 180～190          |                        |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                       |                  | ②～④ 15～20              |
| 基肥+窒素<br>* 追肥     | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕 及び<br>硫安〔21-0-0〕                   | 140～170<br>40～50 |                        |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                       |                  | ①～④ 15～20              |
| 有機基肥 *<br>有機追肥    | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                       | 380～400          | ①～④ 50～60              |
| 基肥一発肥料+<br>追肥成分増加 | BB ねぎ専用S555〔15(9)-15-15〕 及び<br>BBNKプラス80〔16(16)-0-20-Mg1〕 | 180～200<br>45～60 | (16.2～18)<br>(7.2～9.6) |

# 野菜類 (莢実類)

## 45 スイートコーン

適正 pH6.0~6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型            | 品種名               | 栽植様式              | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                |                   |                   | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏どり<br>(マルチ栽培) | ゴールドラッシュ<br>味来390 | 70×30cm<br>4,800株 |       |    | ②  | ①  |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | — | 30  | — | 20 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 3  |

| 施肥例                | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                           |          |                             |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
|                    | 肥料名〔保証成分%〕                                                                 |          | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a |
| 緩効性基肥<br>+<br>りん酸  | CDU入りBB-S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 又は<br>及び | 140~150<br>130~140<br>20~30 |           |
| 基肥+りん酸<br>*<br>追肥  | BB.S888号〔8-8-8-Mg2〕<br>BB-473号〔14-17-13〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕           | 又は<br>及び | 240~260<br>140~150<br>20~30 |           |
|                    | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                        |          |                             | 15~25     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥  | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                        |          | 320~340                     | 50~60     |
| 基肥—発肥料<br>+<br>りん酸 | BB うど専用S555〔15(7.5)-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕                         | 及び       | 120~140<br>20~30            | (9~10.5)  |

## 46 さやえんどう

適正 pH6.0～7.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽培型 | 品種名  | 栽植様式             | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|------|------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |      |                  | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 春どり | 関東1号 | 150×30<br>2,200株 |       |    | ①  |    |    |    |    |    |    | ○   |     |     |
| 秋どり | 福姫   | 同上               |       |    |    |    |    |    |    | ○  | ○  | ①   |     |     |

### 春どり・秋どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | — | 15  | — | 9  |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 3  |

| 施肥例  |                       | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                                                           |                                                    |           |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|      |                       | 肥料名〔保証成分%〕                                                                                 | 基肥 kg/10a                                          | 追肥 kg/10a |
| 春どり  | 緩効性基肥<br>＋<br>りん酸＋加里  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕 | 又は<br>及び<br>及び<br>40～50<br>35～45<br>20～30<br>10～15 |           |
|      | 基肥一発肥料<br>＋<br>りん酸＋加里 | BB 玉ねぎ464〔14(9.8)-16-14〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕                           | 及び<br>及び<br>45～55<br>15～20<br>10～15                | (4.4～5.4) |
| 秋どり  | BB 肥料＋りん酸<br>＊<br>追肥  | BB-286号〔12-18-16〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕                                                  | 及び<br>40～50<br>20～30                               |           |
|      |                       | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                                                        |                                                    | 15～25     |
|      | 基肥一発肥料<br>＋<br>りん酸＋加里 | BB ビール麦エース〔14(5.6)-18-14-Mg1〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕<br>硫酸加里〔0-0-50〕                      | 及び<br>及び<br>45～55<br>20～30<br>10～15                | (2.5～3.1) |
| 春秋どり | 有機基肥<br>＊<br>有機追肥     | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                        | 80～100                                             | 50～60     |

## 47 そらまめ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 120 kg

| 栽培型  | 品種名 | 栽植様式               | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|-----|--------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |     |                    | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普通栽培 | 一寸  | 100×30cm<br>3,000株 |       |    | ①  |    |    |    |    |    |    | ○   | ○   |     |

### 普通栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | — | 12  | — | 8  |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 0  |

| 施肥例                  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                 |                |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                      | 肥料名〔保証成分%〕                                       | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| BB 肥料+りん酸<br>*<br>追肥 | BB-286号〔12-18-16〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕        | 40～50<br>10～20 |           |
|                      | 硫 安〔21-0-0〕                                      |                | 15～20     |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥    | BB マックス有機666〔6-6-6〕                              | 80～90          | 50～60     |
| 基肥—発肥料<br>+<br>りん酸   | BB 玉ねぎ464〔14(9.8)-16-14〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 45～55<br>10～20 | (4.4～5.4) |

## 48 いんげん

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型 | 品種名             | 栽植様式                                 | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                 |                                      | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏どり | まんずなる<br>さつきみどり | 60×25cm<br>2条<br>(条間30cm)<br>13,500株 |       |    |    |    | ○  |    | ①  |    |    |     |     |     |

### 夏どり

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 8  | — | 15  | — | 10 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 0  |

| 施肥例                  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                          |                |                    |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                      | 肥料名〔保証成分%〕                                | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a          |
| BB 基肥+りん酸<br>*<br>追肥 | BB-286号〔12-18-16〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 60～70<br>10～15 |                    |
|                      | 硫 安〔21-0-0〕                               |                | ① 15～20<br>② 10～15 |
| 有機基肥 *<br>有機追肥       | BB マックス有機666〔6-6-6〕                       | 120～140        | ① 50～60<br>② 30～40 |
| 基肥—発肥料               | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕               | 80～90          | (4.5～5.0)          |

## 49 えだまめ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型  | 品種名                 | 栽植様式                                  | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|---------------------|---------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |                     |                                       | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 普通栽培 | 湯あがり娘<br>ゆたか娘<br>雪音 | 50～60×<br>24～30cm<br>6,000～<br>6,900株 |       |    |    | ○  |    | ①  | →  | →  | →  |     |     |     |

### 普通栽培

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 5  | — | 15  | — | 10 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 0  |

| 施肥例                  | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                       |                |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                      | 肥料名〔保証成分%〕                                             | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
| BB 基肥+りん酸<br>*<br>追肥 | BB-286号〔12-18-16〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕           | 40～50<br>10～20 |           |
|                      | 硫安〔21-0-0〕                                             |                | 10～15     |
| 有機基肥 *<br>有機追肥       | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                    | 80～90          | 50～60     |
| 基肥—発肥料<br>+<br>りん酸   | BB ぐんぐん野菜484〔14(5.6)-18-14〕 及び<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg 4.5〕 | 50～60<br>10～15 | (2.8～3.4) |

## 50 オクラ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型  | 品種名      | 栽植様式                                  | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|----------|---------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |          |                                       | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地栽培 | アーリーファイブ | 70～80×<br>15～20cm<br>7,100～<br>8,300株 |       |    |    |    | ○  | ○  | →  | →  | →  | →   |     |     |

### 露地

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 20  | — | 15 |
| (追肥)     | 10 | — | 0   | — | 10 |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分                                      |                    |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕                                            | 基肥 kg/10a          | 追肥 kg/10a           |
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 130～140<br>120～130 |                     |
|                   | 燐硝安加里S646号〔16-4-16〕                                   |                    | ②③ 15～20            |
| 有機基肥<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 240～260            | ① 60～70<br>②③ 50～60 |
| 基肥—発肥料            | BB うど専用S555〔15(7.5)-15-15-Mg1〕                        | 140～150            | (10.5～11.2)         |

# 果 樹

施肥量は黒ボク土を基準としており、黒ボク土以外では、窒素を10～15%増肥する。  
(もも・ブルーベリー以外)

## 5 1 な し

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg

| 栽培型   | 品 種 名                 | 樹 令<br>栽植本数         | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |                       |                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露 地   | 幸 水                   | 8年以上<br>(成木)<br>20本 |           |    | 基  |    |    |    |    |    | ①  |     |     |     |
|       | 豊 水<br>あ き づ き<br>新 高 |                     |           |    | 基  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|       | に っ こ り               |                     |           |    | 基  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ハ ウ ス | 幸 水                   |                     | 基         |    |    |    |    |    |    | ①  |    |     |     |     |

幸水・ハウス幸水  
成木(8年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 13  | — | 15 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 3  |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕              | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | BB なし・りんご007〔10-10-7-Mg2〕 | 140～160   |           |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕        |           | ① 30～35   |
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕    | 140～160   |           |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕        |           | ① 30～35   |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕       | 240～260   | ① 80～90   |

**豊水・あきづき・新高**

**成木(8年以上)**

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 20 — 13 — 20

| 施 肥 例  | 肥 料 名〔保証成分%〕              | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|
| 有機入り基肥 | BB なし・りんご007〔10-10-7-Mg2〕 | 200～220   |           |
| 有機入り基肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕    | 190～210   |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕       | 330～350   |           |

**にっこり**

**成木(8年以上)**

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 20 — 13 — 18

| 施 肥 例  | 肥 料 名〔保証成分%〕              | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|
| 有機入り基肥 | BB なし・りんご007〔10-10-7-Mg2〕 | 200～220   |           |
| 有機入り基肥 | 結集有機888〔8-8-8〕            | 240～260   |           |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕       | 330～350   |           |

## 52 ぶどう

適正 pH6.5～7.0、堆きゅう肥1,000 kg、苦土炭カル 60～80 kg

| 栽培型           | 品種名                    | 樹令<br>栽植本数  | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|------------------------|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|               |                        |             | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地            | 巨峰                     | 11年以上<br>6本 |       |    |    |    |    | ①  |    |    |    |     | ②   |     |
| ハウス           | 巨峰                     | 11年以上<br>6本 |       |    |    | ①  |    |    |    |    |    |     | ②   |     |
| 露地            | キャンベルアーリー<br>シャインマスカット | 8年以上<br>10本 |       |    |    |    |    | ①  |    |    |    |     | ②   |     |
| 雨よけ<br>(簡易被覆) | キャンベル<br>アーリー          | 8年以上<br>10本 |       |    |    |    |    | ①  |    |    |    |     | ②   |     |

### 巨峰

#### 露地・ハウス

#### 成木(11年以上)

|          | 窒素  | りん酸 | 加里 |
|----------|-----|-----|----|
| 施肥基準(基肥) | 4～6 | 11  | 8  |
| (追肥)     | 4   | 0   | 0  |

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕          | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 基肥<br>*<br>追肥     | BB286号〔12-18-16〕    | 40～50     |           |
|                   | 硫安〔21-0-0〕          |           | 15～25     |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕 | 80～100    | 60～80     |

### キャンベルアーリー(露地・雨よけ)

#### シャインマスカット(露地)

#### 成木(8年以上)

|          | 窒素 | りん酸 | 加里 |
|----------|----|-----|----|
| 施肥基準(基肥) | 8  | 8   | 8  |
| (追肥)     | 2  | 0   | 5  |

| 施肥例                  | 肥料名〔保証成分%〕                             | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a      |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥    | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕                 | 70～90                    |                |
|                      | BBNew 野菜追肥 S105〔10-2-15-Mg3〕           |                          | 20～30          |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥+加里 | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕 | 又は<br>130～140<br>130～140 | 15～20<br>15～20 |
|                      | BBelKシリカ〔0-0-46-Mg1-Si11〕              |                          | 5～10           |

### 53 りんご

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 60～80 kg、ようりん 40～60 kg(わい性台:60～80kg)

| 栽培型          | 品種名                                           | 樹令<br>栽植本数     | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|              |                                               |                | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地<br>(マルバ台) | つがる<br>秋映<br>シナノスイート<br>ジョナゴールド<br>ぐんま名月<br>ふ | 10年以上<br>20本   |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 露地<br>(わい性台) | つがる<br>秋映<br>シナノスイート<br>ジョナゴールド<br>ぐんま名月<br>ふ | 7年以上<br>50～70本 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

#### 露地(マルバ台)

#### 成木(10年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 4  | — | 9   | — | 9  |
| (追肥)     | 2  | — | 0   | — | 4  |

| 施肥例                    | 肥料名〔保証成分%〕                                           | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 有機入り+りん酸・加里<br>*<br>追肥 | BB なし・りんご007〔10-10-7-Mg2〕 及び<br>PK化成40号〔0-20-20-Mg4〕 | 35～45<br>20～30 |           |
|                        | BBNK—606号〔16-0-16〕                                   |                | 15～25     |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥+加里   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                  | 60～80          | 30～40     |
|                        | BB eKシリカ〔0-0-46-Mg1-Si11〕                            |                | 10～15     |

#### 露地(わい性台)

#### 成木(7年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 4  | — | 9   | — | 11 |
| (追肥)     | 2  | — | 0   | — | 4  |

| 施肥例                    | 肥料名〔保証成分%〕                                            | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 有機入り+りん酸・加里<br>*<br>追肥 | BB なし・りんご 007〔10-10-7-Mg2〕 及び<br>PK化成40号〔0-20-20-Mg4〕 | 35～45<br>30～40 |                |
|                        | BBNK—606号〔16-0-16〕                                    |                | 15～25          |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥+加里   | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕             | 60～80<br>60～80 | 30～40<br>30～40 |
|                        | BB eKシリカ〔0-0-46-Mg1-Si11〕                             |                | 10～15          |

## 54 う め

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 40～60 kg、ようりん 20～40 kg

| 栽培型 | 品種名    | 樹令<br>栽植本数     | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|--------|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |        |                | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地  | 白玉加賀英高 | 10年以上<br>成木12本 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

成 木(10年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 13  | — | 13 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 3  |

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕             | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕 | 90～110    |           |
|                   | BBNK—606号〔16-0-16〕     |           | ① 15～20   |
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | 梅美人〔8-5-6-B0.1〕        | 120～130   |           |
|                   | BBNK—606号〔16-0-16〕     |           | ① 15～20   |

## 55 か き

適正 pH5.5～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 40～60 kg、ようりん 20～40 kg

| 栽培型 | 品種名             | 樹令<br>栽植本数           | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----------------|----------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                 |                      | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地  | 平核無屋<br>蜂(甲州百目) | 13年以上<br>(成木)<br>19本 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

成 木(13年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 14 | — | 16  | — | 17 |
| (追肥)     | 4  | — | 0   | — | 4  |

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕             | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕 | 130～150   |           |
|                   | BBNK—606号〔16-0-16〕     |           | 20～30     |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕    | 230～240   | 65～75     |

## 56 キウイフルーツ

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 60～80 kg、ようりん 20～40 kg

| 栽培型 | 品種名   | 樹令<br>栽植本数           | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |
|-----|-------|----------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|
|     |       |                      | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月   |
| 露地  | ハイワード | 10年以上<br>成木<br>8～10本 | ~~~~~ |    |    | ①  |    | ①  |    |    |    | □   | 基   | ~~~~~ |

成木(11年以上)

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 12 — 15 — 11.5

(追肥) 3 — 0 — 5.5

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕<br>BB なし・りんご007〔10-10-7-Mg2〕 | 又は<br>110～130<br>110～130 |                 |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕                                  | 20～35                    |                 |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕              | 又は<br>200～220<br>200～220 | 60～90<br>60～100 |

## 57 く り

適正 pH5.0～5.5、堆きゅう肥 1,000 kg

| 栽培型 | 品種名   | 樹令<br>栽植本数                 | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |       |
|-----|-------|----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|
|     |       |                            | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月   |
| 露地  | 丹国筑利石 | 沢見波平鋤<br>9年以上<br>成木<br>12本 | ~~~~~ |    |    | ①  |    | ①  |    | □  |    |     | 基   | ~~~~~ |

成木(9年以上)

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 12 — 11 — 11

(追肥) 3 — 0 — 2

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕                             | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a      |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 有機入り基肥<br>*<br>追肥 | BB なし・りんご007〔10-10-7-Mg2〕              | 110～130                  |                |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕                     |                          | 15～20          |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕 | 又は<br>200～220<br>200～220 | 40～60<br>40～60 |

## 58 もも

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル 60～80 kg

| 栽培型 | 品種名                   | 樹令<br>栽植本数        | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----------------------|-------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                       |                   | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地  | 日川白鳳<br>あかつき<br>川中島白桃 | 8年以上<br>成木<br>12本 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 成木(8年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 8  | — | 7   | — | 7  |
| (追肥)     | 2  | — | 0   | — | 4  |

| 施肥例                          | 肥料名〔保証成分%〕                                           | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a            |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 有機基肥<br>*<br>加里追肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕<br>BB なし・りんご 007〔10-10-7-Mg2〕 | 又は<br>70～90<br>70～90     |                      |
|                              | BBeKシリカ〔0-0-46-Mg1-Si11〕                             |                          | ① 5～10               |
|                              | BBNK-606号〔16-0-16〕                                   |                          | ② 10～15              |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥            | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕               | 又は<br>120～140<br>120～140 | ①② 30～40<br>①② 30～40 |

## 59 すもも

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg

| 栽培型 | 品種名          | 樹令<br>栽植本数   | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|--------------|--------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |              |              | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地  | 大石早生<br>ソルダム | 11年以上<br>12本 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 成木(11年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 11  | — | 11 |
| (追肥)     | 3  | — | 0   | — | 2  |

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕                                           | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a      |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 有機基肥<br>*<br>追肥   | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕<br>BB なし・りんご 007〔10-10-7-Mg2〕 | 又は<br>90～110<br>90～110   |                |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕                                   |                          | 15～20          |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>BB 別格655〔6-5-5〕               | 又は<br>160～180<br>160～180 | 40～60<br>40～60 |

## 60 ブルーベリー

適正 pH ハイブッシュ系 4.0～5.0、ラビットアイ系 4.0～5.5

| 栽培型 | 品種名                                                                       | 樹令<br>栽植本数                       | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                                                                           |                                  | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地  | ハイブッシュ系<br>スハートン<br>アーリーフルー<br>ハークレイ<br>タロウ<br>ラビットアイ系<br>ホームヘル<br>ティフブルー | 7年以上<br>(成木)                     |       |    | ①  |    |    |    |    |    | ②  |     |     |     |
|     |                                                                           | ハイブッシュ<br>166本<br>ラビットアイ<br>110本 |       |    | ①  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 成木(7年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 4  | — | 10  | — | 7  |
| (追肥)     | 4  | — | 0   | — | 0  |

| 施肥例                        | 肥料名〔保証成分%〕                                     | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a            |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 有機入り又は<br>BB 基肥<br>*<br>追肥 | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕 又は<br>BB-286号〔12-18-16〕 | 35～45<br>30～40 |                      |
|                            | 硫安〔21-0-0〕                                     |                | ①② 10～15             |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥          | BB マックス有機666〔6-6-6〕 又は<br>BB 別格655〔6-5-5〕      | 60～80<br>60～80 | ①② 30～40<br>①② 30～40 |

## 61 ゆず

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 1,000 kg

| 栽培型 | 品種名 | 樹令<br>栽植本数   | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----|--------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |     |              | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 露地  |     | 15年以上<br>28本 |       |    | ①  |    |    |    |    |    |    |     | ②   |     |
|     |     |              |       |    |    | ①  |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 成木(15年以上)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 15  | — | 11 |
| (追肥)     | 10 | — | 0   | — | 8  |

| 施肥例               | 肥料名〔保証成分%〕             | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| BB 基肥<br>*<br>追肥  | 堆肥混合肥料まどかちゃん〔10-10-10〕 | 90～110    |           |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕     |           | ①② 30～40  |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕    | 160～180   | ①② 80～90  |

# 花 き

## 6 2 き く

適正 pH5.5～6.0、堆きゆう肥 1,000 kg、苦土炭カル(土壌診断結果から)

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名                          | 栽植様式                                            | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |                                |                                                 | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 施設ぎく<br>(周年)     | 神馬<br>精興の誠<br>精興光玉<br>その他      | 直挿し<br>無摘心栽培<br>条間<br>45cm×2条<br>植<br>株間6～8cm   | ①         | ②  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 露地ぎく             | サマーイエロー<br>その他                 | 条間<br>45cm×2条<br>植<br>株間6～8cm                   |           |    |    | ①② |    |    |    |    |    |     |     |     |
| スプレーぎく<br>(周年)   | モナリサ・<br>セイヒラリー<br>レミタス<br>その他 | 直挿し<br>無摘心栽培<br>ヘッド幅<br>100cm<br>12×12cm<br>8条植 | ①         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 施設ぎく(周年)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 15  | — | 15 |
| (追肥)     | 10 | — | 5   | — | 10 |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                 | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a            |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕      | 130～140   |                      |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕           |           | ② 30～35              |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕          | 240～260   | ①② 80～90             |
| 基肥一発肥料            | ロングトータル花き1号100日〔13-14-8-Mg2〕 | 140～160   | 各成分が 100 日間<br>溶出を継続 |

# 露地ぎく

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 20  | － | 15 |
| (追肥)     | 10 | － | 5   | － | 10 |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                 | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a               |
|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| BB 基肥<br>*<br>追肥  | BB473号〔14-17-13〕             | 100～110   |                         |
|                   | BB オール14〔14-14-14〕           |           | ① 30～40                 |
|                   | BBNK－606号〔16-0-16〕           |           | ② 30～35                 |
| 基肥一発肥料            | ロングトータル花き1号100日〔13-14-8-Mg2〕 | 140～160   | 各成分が<br>100 日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕          | 240～260   | ①② 80～90                |

# スプレーぎく(周年)

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | － | 15  | － | 15 |
| (追肥)     | 5  | － | 5   | － | 5  |

| 施 肥 例            | 肥 料 名〔保証成分%〕                | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a              |
|------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥 | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕     | 100～110   |                        |
|                  | 燐硝安加里1号〔15-15-12〕           |           | ① 30～40                |
| 基肥一発肥料           | ロングトータル花き1号70日〔13-14-8-Mg2〕 | 120～140   | 各成分が<br>70 日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料 *<br>有機追肥   | BB マックス有機666〔6-6-6〕         | 240～260   | ① 80～90                |

### 63 カーネーション

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル(土壌診断結果から)

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名        | 栽植様式                           | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |        |        |        |    |     |     |     |
|------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----|----|----|----|--------|--------|--------|----|-----|-----|-----|
|                  |              |                                | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月     | 7月     | 8月     | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| スタンダード<br>(周年)   | モンテスマ<br>その他 | ベッド幅<br>90cm<br>24×12cm<br>6条植 |           |    |    |    |    | 合<br>× | ①<br>△ | ②<br>△ | ③  | ④   |     |     |
|                  |              |                                | ⑤         | ⑥  | ⑦  |    |    |        |        |        |    |     |     |     |
|                  |              |                                |           |    |    |    |    |        |        |        |    |     |     |     |
| スプレー<br>(周年)     | テッシノ系<br>その他 | ベッド幅<br>90cm<br>24×12cm<br>6条植 |           |    |    |    |    | 合<br>× | ①<br>△ | ②<br>△ | ③  | ④   |     |     |
|                  |              |                                | ⑤         | ⑥  | ⑦  |    |    |        |        |        |    |     |     |     |
|                  |              |                                |           |    |    |    |    |        |        |        |    |     |     |     |

#### スタンダード・スプレー

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 20 | — | 20  | — | 20 |
| (追肥)     | 21 | — | 21  | — | 21 |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                           | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a               |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕                | 170～180   |                         |
|                   | 燐硝安加里1号〔15-15-12〕<br>はつらつ君666〔6-6-6〕   | 又は        | ③～⑦ 15～25<br>③～⑦ 45～55  |
| 基肥一発肥料            | ロングトータル花き1号270日〔13-14-8-Mg2〕           | 260～280   | 各成分が<br>270 日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                    | 320～340   |                         |
|                   | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>はつらつ君666〔6-6-6〕 | 又は        | ①～⑦ 50～60<br>①～⑦ 45～55  |

## 64 りんどう

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 3,000 kg(初年度のみ)

| 栽 培 型<br>及 び<br>作 型 | 品 種 名                      | 栽植様式                                         | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |          |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------|
|                     |                            |                                              | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |          |
| 露 地                 | 極 早 生<br>早 生<br>中 生<br>晩 生 | ベッド幅70cm<br><br>条間<br>30cm×2条<br>植<br>株間20cm |           |    | 基  | ×  |    |    |    |    | ○  |     |     |     |          |
|                     |                            |                                              |           |    | 基  | ○  |    | ①  |    |    |    |     |     |     |          |
| 半 促 成               | 極 早 生<br>早 生               |                                              |           |    | 基  | ×  |    |    |    |    | ○  |     |     |     |          |
|                     |                            |                                              | ○         | ○  | 基  | ①  |    |    |    |    |    |     | 基   |     |          |
|                     |                            |                                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 採花 1～4 年 |
|                     |                            |                                              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 採花 1～4 年 |

### 露地・半促成

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 20  | — | 15 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施 肥 例                       | 肥 料 名〔保証成分%〕                                     | 基肥 kg/10a                         | 追肥 kg/10a          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| BB 基肥 又は<br>緩効基肥<br>*<br>追肥 | BB-473号〔14-17-13〕 又は<br>CDU 燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 100～110<br>90～100                 |                    |
|                             | BBNK-606号〔16-0-16〕                               |                                   | ① 30～35            |
| 基肥一発肥料                      | ロングトータル花き1号100日〔13-14-8-Mg2〕                     | (当年)110～120<br>(2年目以降)<br>120～140 | 各成分が100日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥           | BB マックス有機666〔6-6-6〕                              | 240～260                           | ① 80～90            |

## 65 スターチス

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル(土壌診断結果から)※いずれも初年度のみ

| 栽 培 型<br>及 び<br>作 型 | 品 種 名   | 栽植様式                         | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |        |    |    |    |     |     |     |
|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----|----|----|----|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|                     |         |                              | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 施 設                 | ハイブリット系 | ベッド幅80cm                     |           |    |    |    |    | 合<br>× |    | △  |    |     |     |     |
|                     |         | 条間<br>40cm×2条<br>植<br>株間40cm |           |    | ①  |    |    |        |    |    |    |     |     |     |
|                     |         |                              | 2～5年      |    |    |    |    |        |    |    |    |     |     |     |

### 施 設

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 15  | — | 15 |
| (追肥)     | 3  | — | 3   | — | 3  |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a         | 追肥 kg/10a            |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 100～110<br>90～100 |                      |
|                   | 燐硝安加里1号〔15-15-12〕                                     |                   | ① 15～25              |
| 基肥一発肥料            | ロングトータル花き1号270日〔13-14-8-Mg2〕                          | 110～130           | 各成分が 270 日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 240～260           | ① 50～60              |

## 66 ば ら

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,000 kg、苦土炭カル(土壌診断結果から)

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名                      | 栽植様式                                                      | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |                            |                                                           | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 施設周年             | レット・スター<br>アハランチェ<br>そ の 他 | ベツト幅<br>60～65cm<br>条間<br>35～40cm<br>×2条植<br>株間<br>30～35cm |           |    | ⊗  |    |    |    |    |    | ①  |     | ②   |     |
|                  |                            |                                                           |           | ③  | ④  |    | ⑤  |    | ⑥  |    |    |     |     |     |
|                  |                            |                                                           |           |    |    |    |    |    | △  |    |    |     |     |     |
|                  |                            |                                                           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 周年型

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 15 | — | 30  | — | 15 |
| (追肥)     | 60 | — | 72  | — | 60 |

| 施 肥 例                    | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                              |          | 基肥 kg/10a                  | 追肥 kg/10a   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 緩効性基肥＋<br>りん酸<br>＊<br>追肥 | CDU入 BB－S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕 | 又は<br>及び | 100～110<br>90～100<br>40～50 |             |
|                          | BB－473号〔14-17-13〕                                                         |          |                            | ①～⑥ 70～75   |
|                          | IB燐加安604〔16-10-14〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕                                 | 及び       | 90～100<br>40～60            |             |
|                          | BB－473号〔14-17-13〕                                                         |          |                            | ①～⑥ 65～75   |
| 有機肥料<br>＊<br>有機追肥        | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                       |          | 240～260                    | ①～⑦ 160～170 |

## 67 ゆ り

適正 pH6.0～6.5、落ち葉堆肥 2,000 kg、苦土炭カル 60 kg

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名                | 栽植様式                                                 | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |                      |                                                      | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| オリエ<br>ンタル系      | ソルボンヌ<br>シベリア<br>その他 | ベッド幅<br>150cm<br>条間<br>25cm×6条<br>植<br>株間<br>12～15cm |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  |                      |                                                      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| アジ<br>アティック系     | モギ<br>ロン<br>ナ<br>その他 | ベッド幅<br>140～160cm<br>10～12条植                         |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  |                      |                                                      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### オリエンタル系

窒素 — リン酸 — 加里  
施肥基準(基肥) 10 — 10 — 10

| 施 肥 例  | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a          |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 肥料  | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕                      | 80～90          |                    |
| 緩効性基肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 70～75<br>60～70 |                    |
| 基肥一発肥料 | ロングトータル花き1号100日〔13-14-8-Mg2〕                          | 70～80          | 各成分が100日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 160～180        |                    |

### アジアティック系

窒素 — リン酸 — 加里  
施肥基準(基肥) 12 — 12 — 12

| 施 肥 例  | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a          |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 肥料  | BB-262号〔12-16-12-Mg1-Mn0.5-B0.2〕                      | 95～105         |                    |
| 緩効性基肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 80～90<br>75～80 |                    |
| 基肥一発肥料 | ロングトータル花き1号100日〔13-14-8-Mg2〕                          | 90～100         | 各成分が100日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料   | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                   | 200～220        |                    |

## 68 デルフィニウム

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 2,000 kg

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名                | 栽植様式               | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |                      |                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 施 設              | シネンシス<br>系<br>の<br>他 | ベッド幅90cm           |           |    |    |    |    |    | ○  |    |    |     | ①   |     |
|                  |                      | 条間<br>18cm×5条<br>植 | ②         |    |    |    |    |    | ○  |    | ×  |     |     | ①   |
|                  |                      | 株間18cm             |           | ②  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  |                      |                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 施 設

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 40  | — | 20 |
| (追肥)     | 10 | — | 40  | — | 20 |

| 施 肥 例                       | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                                                                            | 基肥 kg/10a                        | 追肥 kg/10a                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 緩効性基肥<br>＋りん酸・加里<br>＊<br>追肥 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>BBekシリカ〔0-0-46-Mg1-Si11〕<br>又は<br>及び<br>及び | 70～80<br>60～70<br>80～90<br>60～70 |                                  |
|                             | BB-500号〔5-20-20-Mg1〕                                                                                                    |                                  | ①②100                            |
| 基肥－発肥料<br>＋りん酸・加里           | ロングトータル花き1号140日〔13-14-8-Mg2〕                                                                                            | 150～160                          | 各成分が <sup>※</sup> 140日間<br>溶出を継続 |
|                             | 苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>BBekシリカ〔0-0-46-Mg1-Si11〕<br>及び                                                                   | 50～55<br>15～20                   |                                  |
| 有機肥料＋<br>＋りん酸・加里<br>＊<br>追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕<br>PK化成40号〔0-20-20-Mg4〕<br>苦土重焼燐〔0-35-0-Mg4.5〕<br>及び<br>及び                                          | 160～180<br>40～50<br>20～30        |                                  |
|                             | BB マックス有機666〔6-6-6〕                                                                                                     |                                  | ①②80～90                          |

## 69 トルコギキョウ

適正 pH6.5～7.0、落ち葉堆肥 2,000 kg

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名 | 栽植様式                              | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|-------|-----------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |       |                                   | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 施 設              | 早 生 系 | ベッド幅<br>90～100cm<br>株間<br>12～15cm |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                  |       |                                   |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 施 設

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 10  | — | 10 |
| (追肥)     | 2  | — | 0   | — | 2  |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                          | 基肥 kg/10a      | 追肥 kg/10a             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 緩効性基肥<br>*<br>追肥  | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 又は<br>CDU燐加安S555たまご〔15-15-15〕 | 65～75<br>65～70 |                       |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕                                    |                | 10～15                 |
| 基肥一発肥料            | ロングトータル花き1号70日〔13-14-8-Mg2〕                           | 70～80          | 各成分が<br>70日間<br>溶出を継続 |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機 666〔6-6-6〕                                  | 160～180        | 30～40                 |

## 70 シクラメン

適正 pH6.0～6.5、重焼燐、ようりんを施用

| 栽培型<br>及び<br>作 型 | 品 種 名                               | 栽植様式 | 作 型 模 式 図 |         |    |         |    |            |         |    |         |     |     |     |
|------------------|-------------------------------------|------|-----------|---------|----|---------|----|------------|---------|----|---------|-----|-----|-----|
|                  |                                     |      | 1月        | 2月      | 3月 | 4月      | 5月 | 6月         | 7月      | 8月 | 9月      | 10月 | 11月 | 12月 |
| 3号鉢              | ハーフ・ハーフ<br>ヒキクトリア<br>パステル系<br>そ の 他 |      | ○         |         |    |         | ×  |            |         |    | ①       |     |     |     |
| 5号鉢              | ハーフ・ハーフ<br>ヒキクトリア<br>パステル系<br>そ の 他 |      |           |         |    | 3号<br>× |    |            | 5号<br>● |    | ①       |     |     | ○   |
| 6号鉢              | ハーフ・ハーフ<br>ヒキクトリア<br>パステル系<br>そ の 他 |      |           | 3号<br>× |    |         |    | 4号、5号<br>● |         |    | 6号<br>○ |     |     | ○   |

注 ●は鉢上げ

| 栽培型 | 基肥 kg/10a                                                         | 追肥 kg/10a                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3号鉢 | ロング413-70日 0.5g/株<br>エコカリコート 2038—100日 0.3g/株                     | ロング413-70日 2g/株<br>エコカリコート 2038—100日 1g/株 |
| 5号鉢 | ロング413-70日 1g/株<br>ロング413-140日 0.5g/株<br>エコカリコート 2038—140日 0.5g/株 | ロング413-70日 4g/株<br>エコカリコート 2038—100日 2g/株 |
| 6号鉢 | ロング413-70日 1g/株<br>ロング413-140日 1g/株<br>エコカリコート 2038—180日 0.7g/株   | ロング413-70日 7.5g/株                         |

注 基肥・追肥の肥料の保証成分・特性は本書p.26に記載。

## 7 1 アジサイ

適正 pH アジサイ赤 6.0～6.5 アジサイ青 5.5～6.0

| 作物<br>及び<br>作 型        | 品 種 名 | 栽植様式 | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------------|-------|------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                        |       |      | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| アジサイ赤<br>アジサイ青<br>(施設) | きらきら星 |      |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

● 鉢上げ

| 作物    | 基肥 kg/10a                                                                                               | 追肥 kg/10a                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アジサイ赤 | ロング413-70日 2g/ℓ用土<br>ロング413-100日 2g/ℓ用土<br>ようりん 2g/ℓ用土<br>焼成骨粉 2g/ℓ用土<br>苦土重焼燐 2g/ℓ用土<br>(バットグアノ、マグアンプ) | OAT ハウス3号〔13-0-46〕 3割<br>OAT ハウス7号(11-60-0) 7割<br>タンクで 1200～1700 倍とする。<br>(15-30-15 1500～2000 倍液に相当) |
| アジサイ青 | NKエコロング 70日 2g/ℓ用土<br>過石 0.5g/ℓ用土<br>ようりん 1g/ℓ用土<br>硫酸加里 2g/ℓ用土                                         | OAT ハウス3号〔13-0-46〕 3割<br>OAT ハウス7号(11-60-0) 7割<br>タンクで 1500～2000 倍とする。<br>(20-20-20 2000～2500 倍液に相当) |

注1 ( )内が栃木県施肥基準記載の品目

注2 基肥の保証成分・特性について、単肥は本書p.4～7、ロングはp.26、追肥はp.32に記載

## 72 ファレノプシス

適正 pH6.0～6.5

| 作物<br>及び<br>作 型 | 品 種 名                   | 栽植様式 | 作 型 模 式 図      |    |    |    |    |    |    |           |    |     |           |     |
|-----------------|-------------------------|------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|-----|-----------|-----|
|                 |                         |      | 1月             | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月        | 9月 | 10月 | 11月       | 12月 |
| 施設              | ナポレオン<br>ヴィーナス<br>そ の 他 |      | 1次育苗<br>×<br>⊗ |    |    |    |    |    |    |           |    |     | 2次育苗<br>⊗ |     |
|                 |                         |      |                |    |    |    |    |    |    | 花芽誘導<br>● | ⊗  |     |           |     |
|                 |                         |      |                |    |    |    |    |    |    |           |    |     |           |     |
|                 |                         |      |                |    |    |    |    |    |    |           |    |     |           |     |

注 ⊗は冷房室

| 作 型  | 基肥 kg/10a                                                   | 追肥 kg/10a                     |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1次育苗 | ロング413-270日 1.6g/鉢 2.5号<br>エコカリコート 2038—180日<br>0.4g/鉢 2.5号 | エコカリコート 2038—180日 0.4g/鉢 2.5号 |
| 2次育苗 | ロング413-360日 4g/鉢 4号<br>エコカリコート 2038—180日<br>0.8g/鉢 4号       | エコカリコート 2038—180日 0.8g/鉢 4号   |

注 基肥・追肥の肥料の保証成分・特性は本書p.26に記載

# 特 用 作 物

## 7 3 かんぴょう

適正 pH6.0～6.5、稲わら堆肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽 培 型 | 品 種 名                               | 栽植様式             | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------------------------------------|------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |                                     |                  | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|       | ゆ し も う 太<br>し も し つ け<br>し も つ あ お | 600×200cm<br>84株 |           |    |    | ○  | ×  | ①  |    |    |    |     |     |     |

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 12 | — | 12  | — | 12 |
| (追肥)     | 18 | — | 18  | — | 12 |

| 施 肥 例             | ( )内は被覆肥料からの窒素成分             |           |             |
|-------------------|------------------------------|-----------|-------------|
|                   | 肥 料 名〔保証成分%〕                 | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a   |
| 基肥<br>*<br>追肥     | BB-S888号〔8-8-8〕              | 140～160   | 220～230     |
| 緩効性基肥             | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕      | 200～220   |             |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕          | 200～220   | 300～320     |
| 基肥一発肥料            | BB タマイズミ専用666〔16(8.7)-16-16〕 | 180～200   | (15.6～17.4) |

## 74 こんにゃく

適正 pH6.0～6.5、落ち葉堆肥 2,000 kg、苦土炭カル 80 kg

| 栽培型 | 品種名                         | 栽植様式             | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----------------------------|------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                             |                  | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1年生 | 在来種<br>あかぎおおだ<br>ま<br>みやまさり | 60×12cm<br>2条ちどり |       |    |    |    | ○  | ①  |    |    |    |     |     |     |
| 2年生 |                             | 60×20cm          |       |    |    |    | ○  | ①  |    |    |    |     |     |     |
| 3年生 |                             | 60×30cm          |       |    |    |    | ○  | ①  |    |    |    |     |     |     |

### 1年生・2年生・3年生

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 10 | — | 14  | — | 10 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施肥例               | ( )内は被覆肥料からの窒素成分         |           |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                   | 肥料名〔保証成分%〕               | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 基肥一発肥料            | BB こんにゃく専用肥料〔10(5)-4-12〕 | 130～150   | (6.5～7.5) |
| 緩効性基肥             | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕  | 100～120   |           |
| BB 基肥<br>*<br>追肥  | BB オール14〔14-14-14〕       | 70～80     |           |
|                   | BBNK-606号〔16-0-16〕       |           | 30～40     |
| 有機肥料<br>*<br>有機追肥 | BB マックス有機666〔6-6-6〕      | 160～180   | 80～100    |

## 75 とうがらし

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 1,500 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型 | 品種名            | 栽植様式              | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|----------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                |                   | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|     | 栃木三鷹<br>しんさんたか | 60×25cm<br>6,700株 |           |    | ○  | ×  |    |    |    |    |    |     |     |     |

|          |    |   |     |   |    |
|----------|----|---|-----|---|----|
|          | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
| 施肥基準(基肥) | 14 | — | 15  | — | 10 |
| (追肥)     | 5  | — | 0   | — | 5  |

| 施肥例           | ( )内は被覆肥料からの窒素成分               |           |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
|               | 肥料名〔保証成分%〕                     | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
| 基肥<br>*<br>追肥 | BB-473号〔14-17-13〕              | 90～110    |           |
|               | BBNK-606号〔16-0-16〕             |           | 30～35     |
| 基肥一発肥料        | BB うど専用555号〔15(7.5)-15-15-Mg1〕 | 100～120   | (7.5～9.0) |

## 76 あ さ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 採織用 1,000 kg 採種用 600 kg、※いずれも苦土炭カル 60 kg

| 栽培型   | 品種名   | 栽植様式                                | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|-------|-------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |       |                                     | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 採 織 用 | とちぎしろ | 畝幅24cm<br>播種量<br>3～4kg/10a          |           |    |    | ○  | —  | —  | □  |    |    |     |     |     |
| 採 種 用 |       | 90×30cm<br>播種量<br>0.6～<br>0.7kg/10a |           |    |    |    |    | ○  | —  | —  | —  | □   |     |     |

### 採織用

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 10 — 15 — 8

| 施 肥 例 | 肥 料 名〔保証成分%〕            | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| BB 基肥 | BB-473号〔14-17-13〕       | 70～80     |           |
| 緩効性基肥 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 | 70～80     |           |

### 採種用

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 5 — 7 — 5

| 施 肥 例 | 肥 料 名〔保証成分%〕            | 基肥 kg/10a | 追肥 kg/10a |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| BB 基肥 | BB-473号〔14-17-13〕       | 30～40     |           |
| 緩効性基肥 | CDU入 BB-S444号〔14-14-14〕 | 30～40     |           |

# 飼 料 作 物

## 77 トウモロコシ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 4,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型          | 品 種 名                                       | 利用目的  | 栽植様式                             | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|              |                                             |       |                                  | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中山間・<br>高冷地帯 | 36B08<br>34N84<br>PO640<br>TX1241           | サイレージ | 7,000粒<br>(極早生)                  |           |    |    |    | ○  | —  | —  | □  |    |     |     |     |
| 平坦・<br>中山間地帯 | KD640<br>SH4681<br>KD671<br>ZX4182<br>P2088 |       | 7,000粒<br>(早 生)                  |           |    |    |    | ○  | —  | —  | □  |    |     |     |     |
| 平坦・<br>中山間地帯 | 31P41<br>KD731<br>32F27<br>NS127            |       | 6,500～<br>6,800粒<br>(中生・<br>中晩生) |           |    |    |    | ○  | —  | —  | □  |    |     |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 22 — 20 — 35

| 施 肥 例    | 肥 料 名〔保証成分%〕                                             |          | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| BB 肥料+加里 | BB オール15〔15-15-15〕<br>BB オール14〔14-14-14〕<br>塩化加里〔0-0-60〕 | 又は<br>及び | 140～150<br>150～160<br>20～30 |           |

## 78 ソルガム

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型              | 品種名                                 | 利用目的  | 栽植様式                       | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                  |                                     |       |                            | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平坦・<br>中山間地<br>帯 | スーパーシュガー<br>ソルゴー<br>ビッグシュガー<br>ソルゴー | サイレージ | 散播<br>2～3kg<br>条播<br>1～2kg | 子実型   |    |    |    | ○  | —  | —  | □  |    |     |     |     |
|                  |                                     |       |                            | ソルゴー型 |    |    |    | ○  | ○  | —  | □  |    | □   |     |     |
|                  |                                     |       |                            |       |    |    |    | ○  | ○  | —  | □  |    | □   |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里  
 施肥基準(基肥) 20 — 18 — 30  
 (追肥) 3 (2回刈の場合)

| 施肥例                 | 肥料名〔保証成分%〕                                                       | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| BB 肥料+加里<br>*<br>追肥 | BB オール15 [15-15-15] 又は<br>BB オール14 [14-14-14] 及び<br>塩化加里[0-0-60] | 130～140<br>140～150<br>15～25 |           |
|                     | 硫安 [21-0-0](2回刈の場合)                                              |                             | 15～20     |

## 79 スーダングラス及びスーダン型ソルガム

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型    | 品種名                        | 利用目的  | 栽植様式                                                   | 作型模図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|        |                            |       |                                                        | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平坦・山間地 | ヘイスダン<br>スタックス<br>ラッキーソルゴー | サイレージ | スーダングラス<br>(散播)<br>6～8kg<br>スーダン型ソル<br>ガム(散播)<br>2～3kg |      |    |    |    | ○  |    |    | □  |    | □   |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 15 — 13 — 30

(追肥) 2 (2回刈の場合)

| 施肥例                 | 肥料名〔保証成分%〕                                                       | 基肥 kg/10a                  | 追肥 kg/10a |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| BB 肥料+加里<br>*<br>追肥 | BB オール15 [15-15-15] 又は<br>BB オール14 [14-14-14] 及び<br>塩化加里[0-0-60] | 90～110<br>105～110<br>20～30 |           |
|                     | 硫安 [21-0-0] (2回刈の場合)                                             |                            | 10～15     |

## 80 飼料用イネ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg

| 栽培型    | 品種名                                      | 利用目的                   | 栽植様式                                   | 作型模図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|        |                                          |                        |                                        | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平坦・山間地 | 夢あおば<br>たちすが<br>た<br>ホシアハ<br>クサハミ<br>月の光 | サイレージ<br>(WCS)<br>飼料用米 | 湛水直播<br>乾田直播<br>移植早植<br>移植普通植<br>3～5kg |      |    |    |    | ○  |    |    |    |    | □   |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 10 — 10 — 15

(追肥) 3 — 0 — 0

| 施肥例                 | 肥料名〔保証成分%〕                                                                             | 基肥 kg/10a               | 追肥 kg/10a                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| BB 肥料+加里<br>*<br>追肥 | BB オール15 [15-15-15] 又は<br>BB オール14 [14-14-14] 及び<br>塩化加里[0-0-60]                       | 60～70<br>70～80<br>5～15  |                                              |
|                     | 硫安 [21-0-0]                                                                            |                         | 15～20                                        |
| 基肥一発肥料              | BB ファイト055 [30(15)-5-5] 又は<br>BB 飼料米 211 [20(8)-10-10] 又は<br>BB コメトレ400 [24(12)-10-10] | 20～45<br>40～60<br>30～45 | (3.0～ <b>6.7</b> )<br>(3.2～4.8)<br>(3.6～5.4) |

## 8 1 イタリアンライグラス

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型                 | 品種名                                                                | 利用目的        | 栽植様式          | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|                     |                                                                    |             |               | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平坦・<br>中山間・<br>高冷地帯 | ワセユタカ<br>タチマサリ<br>いなずま<br>タチムシャ<br>さつきば<br>れ タチ<br>サ カ エ<br>ジャイアント | サイレージ<br>乾草 | 2～3kg<br>(散播) |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                     |                                                                    |             |               |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|                     |                                                                    |             |               |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 13 — 12 — 25

(追肥) 2 (2回刈の場合)

| 施肥例                 | 肥料名〔保証成分%〕                                                       | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| BB 肥料+加里<br>*<br>追肥 | BB オール15 [15-15-15] 又は<br>BB オール14 [14-14-14] 及び<br>塩化加里[0-0-60] | 80～90<br>90～100<br>15～25 |           |
|                     | 硫安 [21-0-0](2回刈の場合)                                              |                          | 5～10      |

## 8 2 ライムギ

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 3,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型          | 品種名             | 利用目的  | 栽植様式          | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------|-----------------|-------|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|              |                 |       |               | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中山間・<br>高冷地帯 | キングライ麦<br>春 一 番 | サイレージ | 6～8kg<br>(散播) |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|              |                 |       |               |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 13 — 12 — 25

| 施肥例      | 肥料名〔保証成分%〕                                                    | 基肥 kg/10a                | 追肥 kg/10a |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| BB 肥料+加里 | BB オール15 [15-15-15] 又は<br>BB オール14 [14-14-14]<br>塩化加里[0-0-60] | 80～90<br>90～100<br>15～25 |           |
|          |                                                               |                          |           |

### 83 エンバク

適正 pH5.5～6.0、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 100 kg

| 栽培型           | 品種名      | 利用目的  | 栽植様式            | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|----------|-------|-----------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|               |          |       |                 | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平坦・中山間地帯(年内刈) | スーパーハヤテ隼 | サイレージ | 8～10 kg<br>(散播) |       |    |    |    |    |    |    |    | ○  | ○   | —   | □   |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 9 — 8 — 18

| 施肥例      | 肥料名〔保証成分%〕                                                         | 基肥 kg/10a               | 追肥 kg/10a |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| BB 肥料+加里 | BB オール15 [15-15-15]<br>BB オール14 [14-14-14]<br>塩化加里[0-0-60]<br>又は及び | 55～65<br>60～70<br>10～20 |           |

### 84 飼料用ヒエ

適正 pH5.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg

| 栽培型         | 品種名                | 利用目的           | 栽植様式          | 作型模式図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|             |                    |                |               | 1月    | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平坦・中山間・高冷地帯 | グリーンミレット<br>青葉ミレット | 青刈リサイレージ<br>乾草 | 3～5kg<br>(散播) |       |    |    |    | ○  | —  | □  |    | ○  | —   | □   |     |

窒素 — リン酸 — 加里

施肥基準(基肥) 9 — 8 — 17

| 施肥例      | 肥料名〔保証成分%〕                                                         | 基肥 kg/10a            | 追肥 kg/10a |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| BB 肥料+加里 | BB オール15 [15-15-15]<br>BB オール14 [14-14-14]<br>塩化加里[0-0-60]<br>又は及び | 60<br>60～70<br>10～20 |           |

## 85 永年牧草

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 採草用:3,000 kg、放牧用:2,000kg、

苦土炭カル 100～200、ようりん 50～100 kg

| 栽培型 | 品種名                                                                | 利用目的                 | 栽植様式                                                                                                                                                                                                                                | 作型模図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|     | マキバミドリ<br>ポトマック<br>(オーチャードグラス)                                     | サイレージ<br>乾草<br>(採草用) | 標高500m<br>オーチャード <sup>*</sup><br>2.5～3.0kg                                                                                                                                                                                          |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|     | クンプウ<br>クライマックス<br>(チモシー)                                          |                      | 標高<br>1,000m<br>オーチャード <sup>*</sup><br>2.5kg<br>チモシー<br>0.5kg                                                                                                                                                                       |      |    |    |    |    |    |    |    | ○  |     |     |     |
|     | マキバミドリ<br>ポトマック<br>(オーチャードグラス)                                     | 放牧用                  | 標高500m<br>オーチャード <sup>*</sup><br>2.kg<br>ケンタッキー<br>0.5kg<br>シロクロパー<br>0.5kg                                                                                                                                                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|     | ヘリオス<br>なつさかり<br>(チモシー)<br>ニュージールランドホワイト<br>カリフォルニアラジノ<br>(シロクロパー) |                      | 標高<br>1000m<br>集約的<br>放牧<br>ヘレニアル<br>2.5kg<br>ケンタッキー<br>0.3kg<br>シロクロパー<br>0.2kg<br>中間型<br>放牧<br>オーチャード <sup>*</sup><br>2kg<br>ケンタッキー<br>0.3kg<br>シロクロパー<br>0.2kg<br>粗放的<br>放牧<br>チモシー<br>2kg<br>ケンタッキー<br>0.3kg<br>シロクロパー<br>0.2kg |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|     | ヤツカゼ2<br>ジャイアント<br>(ヘレニアルライグラス)                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

## サイレージ、乾草(採草用)

|                |    |   |     |   |    |
|----------------|----|---|-----|---|----|
|                | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準 播種当年度(基肥) | 16 | － | 15  | － | 30 |
| 次年度以降(追肥)      | 16 | － | 15  | － | 30 |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                         | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 播種当年度<br>BB 肥料＋加里 | BB オール15〔15-15-15〕<br>BB オール14〔14-14-14〕<br>塩化加里〔0-0-60〕<br>又は<br>及び | 100～110<br>110～120<br>20～30 |                             |
| 次年度以降<br>BB 肥料＋加里 | BB オール15〔15-15-15〕<br>BB オール14〔14-14-14〕<br>塩化加里〔0-0-60〕<br>又は<br>及び |                             | 100～110<br>110～120<br>20～30 |

## 放 牧 用

|                |    |   |     |   |    |
|----------------|----|---|-----|---|----|
|                | 窒素 | － | りん酸 | － | 加里 |
| 施肥基準 播種当年度(基肥) | 16 | － | 15  | － | 30 |
| 次年度以降(追肥)      | 14 | － | 11  | － | 22 |

| 施 肥 例             | 肥 料 名〔保証成分%〕                                                         | 基肥 kg/10a                   | 追肥 kg/10a              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 播種当年度<br>BB 肥料＋加里 | BB オール15〔15-15-15〕<br>BB オール14〔14-14-14〕<br>塩化加里〔0-0-60〕<br>又は<br>及び | 100～110<br>110～120<br>20～30 |                        |
| 次年度以降<br>BB 肥料＋加里 | BB オール15〔15-15-15〕<br>BB オール14〔14-14-14〕<br>塩化加里〔0-0-60〕<br>又は<br>及び |                             | 90～100<br>100<br>10～20 |

# 桑 ・ 茶

## 86 桑

適正 pH6.0～6.5、堆きゅう肥 2,000 kg、苦土炭カル 160 kg、ようりん 30 kg

| 栽培型   | 品 種 名                        | 栽植様式と<br>植付本数      | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|------------------------------|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|       |                              |                    | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 壮 蚕 用 | 一の瀬<br>改良鼠返<br>しんいちの<br>せその他 | 1.5m×2.2m<br>×0.4m |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|       |                              |                    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

### 壮蚕用

|           | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
|-----------|----|---|-----|---|----|
| 施肥基準(追肥①) | 12 | — | 5   | — | 5  |
| (追肥②)     | 12 | — | 5   | — | 5  |
| (追肥③)     | 6  | — | 3   | — | 2  |
| (追肥①)     | 24 | — | 10  | — | 10 |

| 施 肥 例    | 肥 料 名〔保証成分%〕                       | 春 肥<br>①  | 夏 肥<br>②  | 追 肥<br>③ |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| BB 肥料+窒素 | BBS-888〔8-8-8-Mg2〕                 | 70～80     | 70～80     | 30～45    |
|          | 硫安〔21-0-0〕                         | 20～30     | 20～30     | 10～20    |
| 普通化成     | くみあい化成32号〔12-5-6〕                  | 100       | 100       | 50       |
| 固形肥料     | 桑特2号〔10-4-4〕 又は<br>桑スーパー特号〔15-7-8〕 | 120<br>80 | 120<br>80 | 60<br>40 |
| 基肥一発肥料   | BB 桑専用 566〔15(4.5)-6-6-Mg2〕        | 160～170   | (7.2～7.6) |          |

## 87 茶

適正 pH5.0～5.5、堆きゅう肥 幼木 2,000kg 成木 3,000 kg、

苦土炭カル 幼木 80kg 成木 100 kg

| 栽培型 | 品種名  | 栽植様式                                  | 作 型 模 式 図 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|-----|------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |      |                                       | 1月        | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 幼 木 | ヤブキタ | 12～15<br>×2～3cm<br>22,000<br>～41,000本 |           |    | ○  |    | ①  |    | ②  | ③  |    |     |     |     |
| 成 木 | ヤブキタ | 180×30cm<br>1,850本                    |           |    | ①  |    |    | ②  | ③  |    | ④  |     |     |     |

### 幼 木

|           | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
|-----------|----|---|-----|---|----|
| 施肥基準(追肥①) | 2  | — | 0   | — | 2  |
| (追肥②)     | 2  | — | 0   | — | 0  |
| (追肥③)     | 5  | — | 5   | — | 4  |

| 施 肥 例                           | 肥 料 名〔保証成分%〕        | 追肥①   | 追肥②  | 追肥③   |
|---------------------------------|---------------------|-------|------|-------|
| BB 肥料<br>*<br>窒素<br>*<br>有機入り肥料 | BBNK—606号〔16-0-16〕  | 10～15 |      |       |
|                                 | 硫安〔21-0-0〕          |       | 5～10 |       |
|                                 | BB—S888号〔8-8-8-Mg2〕 |       |      | 60～70 |

### 成 木

|           | 窒素 | — | りん酸 | — | 加里 |
|-----------|----|---|-----|---|----|
| 施肥基準(追肥①) | 15 | — | 8   | — | 10 |
| (追肥②)     | 8  | — | 5   | — | 5  |
| (追肥③)     | 8  | — | 5   | — | 5  |
| (追肥④)     | 15 | — | 8   | — | 10 |

| 施 肥 例    | 肥 料 名〔保証成分%〕                         | 追肥①             | 追肥②            | 追肥③            | 追肥④             |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| BB 肥料+窒素 | BB—S888号〔8-8-8-Mg2〕 及び<br>硫安〔21-0-0〕 | 80～100<br>30～40 | 40～60<br>10～20 | 40～60<br>10～20 | 80～100<br>30～40 |

注 追肥①は3月と4月上旬の2回に分けて施用する。