水稲用一発処理除草剤

2成分で雑草撃退！

ホクコー

エーワン

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

1キロ粒剤：農林水産省登録第22606号
フロアブル：農林水産省登録第22610号
ジャンボ　：農林水産省登録第22608号

水田におすすめの除草剤

1キロ粒剤　フロアブル　ジャンボ

①ノビエに効果が長い！

②ホタルイ・オモダカなど
問題となる水田雑草に
幅広く効く！

③雑草が白く枯れるので
効果が分かりやすい！

北興化学工業株式会社

ホクコー
エーワン®

●1キロ粒剤
有効成分：オキサジクロメホン・・・0.80%
テフリルトリオン・・・・・3.0%
●フロアブル
有効成分：オキサジクロメホン・・・1.2%
テフリルトリオン・・・・・6.0%
●ジャンボ
有効成分：オキサジクロメホン・・・2.0%
テフリルトリオン・・・・10.0%

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

■適用雑草および使用方法（関東・東山・東海地域を抜粋）

2016年8月末日現在の適用内容

剤型	作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量	総使用回数※	使用方法
1キロ粒剤	移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ	移植後5日～ノビエ2．5葉期 但し、収穫45日前まで	砂壌土	1kg	本剤：1回 オキサジクロメホン：2回 テフリルトリオン：2回	湛水散布 又は 無人ヘリコプターによる散布
			移植後5日～ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで	壌土～埴土			
	直播水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ2．5葉期 但し、収穫45日前まで	砂壌土～埴土			
フロアブル	移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ	移植後5日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	砂壌土～埴土	500ml	本剤：1回 オキサジクロメホン：2回 テフリルトリオン：2回	原液湛水散布 又は 水口施用 又は 無人ヘリコプターによる滴下
	直播水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ3葉期 但し、収穫90日前まで	砂壌土～埴土			
ジャンボ	移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、オモダカ	移植後5日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	砂壌土	小包装（パック）10個（300g）	本剤：1回 オキサジクロメホン：2回 テフリルトリオン：2回	水田に小包装（パック）のまま投げ入れる
			移植後5日～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	壌土～埴土			
	直播水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで	砂壌土～埴土			

※印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

■使用上の注意事項

●浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付け作業は丁寧に行ってください。未熟有機物を使用した場合は、特に丁寧に行ってください。

●散布の際は水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布してください。また、極端な浅水や深水での使用は避けてください。散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態（水深3～5cm、ジャンボ剤では5～6cm）を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。

●以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用を避けてください。

①砂質土壌の水田及び漏水田（減水深2cm／日以上）

②軟弱な苗を移植した水田

③極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田

●本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には、十分注意してください。

●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

【フロアブル】本剤が多量に稲体に付着した場合に、付着した葉ならびに直後に伸展してくる新葉1～2枚に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。なお、ノズル散布をした場合、白化症状が強く出ることがあります。

【1キロ粒剤】まれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

【ジャンボ剤】拡散が不十分な場合などに、まれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
●使用後の空袋・空ボトルは圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

JAグループ
農　協｜全農｜経済連
全農は登録商標　第4702318号

北興化学工業株式会社
〒103-8341　東京都中央区日本橋本石町4-4-20