



ボデーガード **プロ**


新登場

2成分で稲を守る 新世代の除草剤、プロ。 新規有効成分トリアファモン配合

優れた枯殺力! 長期残効!!

鉄コーティング直播でも使用可

ホタルイ




オモシカ



コウキヤガラ



ノビエ



クログワイ



後発クログワイ



デフリットオンでよく鋭く枯らす!

トリアファモンが長く効く!

多年生雑草の塊茎形成抑制効果 — 翌年の発生を抑えることができます

	無処理	ボデーガードプロ処理
クログワイの塊茎形成抑制	深さ	深さ
	0-15 cm	0-15 cm
	15-30 cm	15-30 cm
	新塊茎 旧塊茎	新塊茎 旧塊茎





殺草スペクトラム

本剤はスルホニルウレア抵抗性雑草含め、ほとんどの水田雑草に対して優れた効果があります。

薬剤名	処理時期	一年生雑草										多年生雑草										
		ノビエ	カヤツリグサ	コナギ	ミスアオイ	アセナ	キカシグサ	ミソハコベ	クサネム	イボクサ	ヒメミソハギ	マツバイ	ホタルイ	ミスガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	シスイ	コウキヤガラ	クログワイ	オモダカ	キシヨウセンノヒエ
ボデーガード プロ	雑草 発生前	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	○	●	●	●	●	●	◎	◎*	◎	◎	◎	●
	ノビエ 3葉期	●	●	●	○	●	△	●	●	●	△	●	●	●	●	●	◎	◎*	●	●	●	◎

●：効果極大 ◎：高い効果 ○：効果あり △：効果やや不十分 ×：効果不十分
*本剤の一回使用では完全に防除できない場合があるので、これらの雑草の防除には有効な薬剤との組み合わせで使用する。
赤字の草種はスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草を含む。

適用雑草と使用方法

（2016年10月現在の登録内容）

■ ボデーガードプロ 1キロ粒剤

有効成分：デフリルトリオン…3.0% トリアファモン…0.50% 農林水産省登録：第23793号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ	移植後5日～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	1kg/10a	本剤 1回 デフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	湛水散布
直播水稲	水田一年生雑草 及び、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで			

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

■ ボデーガードプロ フロアブル

有効成分：デフリルトリオン…5.8% トリアファモン…0.97% 農林水産省登録：第23795号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ	移植後5日～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで	500mℓ/10a	本剤 1回 デフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	原液湛水散布
直播水稲	水田一年生雑草 及び、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ	稲1葉期～ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日前まで			

本剤が多量に稲体に付着した場合に、付着した葉ならびに直後に伸展してくる新葉1～2枚に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。なお、ノズル散布をした場合、白化症状が強く出ることがあります。

■ ボデーガードプロ ジャンボ

有効成分：デフリルトリオン…10.0% トリアファモン…1.6% 農林水産省登録：第23797号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ	移植後5日～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	小包装(パック) 10個 (300g)/10a	本剤 1回 デフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる
直播水稲	水田一年生雑草 及び、マツバイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	湛水直播の稲1葉期～ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで			

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

散布時期 田植5日後から、ノビエ3.5葉期(ジャンボは3葉期)までに散布

■ 一発処理(ボデーガードプロのみ)の場合の例



■ 初期剤との体系処理の場合の例



■ 初中期一発剤との体系処理の場合の例



※水質汚濁防止のため、
**農薬散布後7日間
は落水しないよう
お願いします。**
※初期剤の種類につき
ましては、栽培区分に
より使える除草剤が異
なります。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



JAグループ

農 協

全 農

経 済 連

登録商標 第4702318号

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078

9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祝日を除く

(F-TKY-353 16.10.IS)