

# ノビエ、ホタルイのとりこぼし対策や オモダカに困っている方にお勧めです！

水稻用中後期除草剤

## ワイドショット® 1キロ粒剤

®は、北興化学工業株式会社の登録商標



こんな雑草に効果があります (一部抜粋)

※( )内は各雑草に対する散布時期の晩限を示します。



ノビエ(4葉期まで)※



ホタルイ(4葉期まで)※



オモダカ(30cmまで)※



クサネム  
(10cmまで)※



イボクサ  
(水田内の発生を抑えます)



コナギ  
(4葉期まで)※



アゼナ  
(2対葉期まで)※

### 枯れ方の様子

	【ノビエ】 4葉期処理	【ホタルイ】 4葉期処理	【オモダカ】 矢じり葉1葉期処理	【コナギ】 4葉期処理	【クサネム】 10cm処理
処理前					
処理後	 処理34日後	 処理34日後	 処理34日後	 処理28日後	 処理35日後
無処理区					

ワイドショット® は、雑草をゆっくり、しっかり枯らします！

# 塊茎抑制効果

## 【ワイドショット1キロ粒剤の塊茎抑制効果（圃場試験）】

	ワイドショット1キロ粒剤 (移植15日後処理)	メテオ1キロ粒剤 (移植当日処理) + ワイドショット1キロ粒剤 (移植15日後処理)	無処理
オモダカ			

(H25年 北興化学工業㈱ 試験区内1㎡の範囲を20cmの深さで掘り、塊茎を採取した)

## 使用上のポイント

- ① 本剤の散布時期晩限に注意して散布してください。  
ノビエは4葉期まで、ホタルイは4葉期まで、オモダカは30cmまで、クサネムは10cmまで、コナギは4葉期まで、アゼナは2対葉期まで、ウリカワ3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで。
- ② 初期剤・一発処理剤との体系防除に用いる中後期除草剤としてご活用いただけます。



※ 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## 以上をまとめるとワイドショット1キロ粒剤はこんな除草剤です

- ① ノビエ、ホタルイはもちろん、オモダカ、イボクサ、クサネムなどの厄介な雑草にも高い除草効果を発揮します。
- ② SU抵抗性雑草や多年生雑草にも有効で、塊茎抑制効果に優れます。
- ③ 移植後15日からノビエ4葉期まで使用可能なため処理時期幅が広い。
- ④ やや遅効的であり、雑草が完全に枯れるまでに時間を要します。

## 適用雑草および使用方法

(関東・東山・東海地域の登録内容を抜粋 平成28年7月末日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ	移植後15日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布

テフリルトリオンを含む農業の総使用回数

2回以内

ペノキスラムを含む農業の総使用回数

2回以内

- 使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋は圃場や水路などに放置せず適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。