

水稻用 中・後期除草剤



# ツイゲキ®

1キロ粒剤

豆つぶ® 250

**ホタルイ・塊茎雑草に素早い枯殺力の体系剤**

- ✓ 新規成分「フェンキノトリオン」が雑草を白く枯らす
- ✓ 花茎が抽出し始めたホタルイに高い除草効果
- ✓ 生育の進んだコナギ、オモダカ、クログワイ、シズイに卓効
- ✓ 豆つぶ剤はドローン散布にもおすすめ



1kg  
(10a分)



10kg  
(1ha分)



250g  
(10a分)



2.5kg  
(1ha分)



野稗

ノビエ

4葉期まで

沢瀉

オモダカ

矢尻葉4葉期まで

蛍蘭

ホタルイ

草丈20cmまで



草丈10cmまで\*

黒慈姑

クログワイ

草丈30cmまで

草丈20cmまで\*



豆つぶ剤×ドローン散布

- ◆ 水面を拡散する製剤なので散布ムラに強い
- ◆ 豆が大きいと薬剤落下の様子が明瞭で、ドリフトや葉の隙間に入る恐れが少ない
- ◆ 10aあたり250gと軽量なためバッテリーの負担を軽減し稼働時間を増加できる
- ◆ 除草剤（初/初中/中後）や本田剤などの幅広いラインナップ

|       | 1キロ粒剤         | 豆つぶ剤           |
|-------|---------------|----------------|
| 薬剤の重量 | 1 haあたり 10 kg | 1 haあたり 2.5 kg |
| 散布時間  | 1 haあたり 10 分  | 1 haあたり 5 分    |
| 枕地の散布 | 丁寧な散布が必要      | 必要なし           |
| 飛行経路  | 均一散布          | 均一散布は不要        |
|       |               |                |

\*対象雑草に対する推奨の散布時期。



## 適用雑草と使用方法

1キ口粒剤＜登録番号：第24169号＞

2021年1月13日現在

| 作物名  | 適用雑草名                                                         | 使用量     | 使用時期                                       | 本剤の使用回数                                                                       | 使用方法 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 移植水稻 | 一年生雑草及び<br>多年生広葉雑草<br>アオミドロ・藻類<br>による表層はく離                    | 1kg/10a | 移植後20日（稲5葉期以降）<br>～北 I4葉期<br>（但し、収穫75日前まで） | 1回<br><br>各成分を含む農薬<br>の総使用回数<br>シメトリン 2回以内<br>ピリミスルファン 2回以内<br>フェンキントリオン 2回以内 | 湛水散布 |
| 直播水稻 | 一年生雑草<br>ウリカワ、ヒメジョオン、<br>クログワイ、セリ<br>ヒメジョオン、ホトハ<br>マツバ、ミズガヤツリ |         | 稲5葉期～北 I4葉期<br>（但し、収穫75日前まで）               |                                                                               |      |

豆つぶ250＜登録番号：第24472号＞

| 作物名  | 適用雑草名                                                      | 使用量          | 使用時期                                       | 本剤の使用回数                                                                       | 使用方法                         |
|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 移植水稻 | 一年生雑草及び<br>マツバ、ヒメジョオン、ウリカワ、ミ<br>ズガヤツリ、アオミドロ、藻類<br>による表層はく離 | 250g<br>/10a | 移植後20日（稲5葉期以降）<br>～北 I4葉期<br>（但し、収穫75日前まで） | 1回<br><br>各成分を含む農薬<br>の総使用回数<br>シメトリン 2回以内<br>ピリミスルファン 2回以内<br>フェンキントリオン 2回以内 | 湛水散布又<br>は無人航空<br>機による散<br>布 |


## 各種雑草の殺草葉齢限界

| 雑草名              | 1キ口粒剤     |
|------------------|-----------|
| ノビエ              | 4葉期まで     |
| コナギ              | 6葉期まで*    |
| ヘラオモダカ           | ヘラ葉1葉期まで  |
| ホタルイ             | 草丈10cmまで* |
| ミズガヤツリ、ウリカワ      | 5葉期まで     |
| クログワイ、シズイ、コウキヤガラ | 草丈30cmまで  |
| オモダカ             | 矢尻葉4葉期まで  |
| アオミドロ・藻類による表層剥離  | 発生初期まで    |
| ヒメジョオン           | 発生盛期まで    |
| セリ               | 増殖期まで     |


雑草が上記葉齢を超えない時期に余裕をもって散布してください。  
\*1:2020年栃木県内における社内試験結果に基づく。  
\*2:登録は草丈20cmまでですが、安定した効果のため10cmまでの使用をお勧めします。  
\*雑草が登録葉齢を超えない時期に余裕をもって散布してください。  
\*植物体が小さいほど安定した効果を有します。  
\*例年問題雑草の抑えきれない圃場では移植後20日頃の早めの散布をおすすめします。

## おすすめの散布時期

問題雑草が大きくなる前に  
散布しましょう



## こんな雑草にも効果アリ





## ドローン (MG-1 T20) による豆つぶ散布方法

始めての方は下記設定から  
散布を実施してください

＜開度、回転数、速度の設定＞＜飛行経路（例）＞

- ◆ シャッター開度：70%
- ◆ インペラ回転数：300回転/分
- ◆ 速度：10km/時
- ◆ 散布幅：15m
- ◆ 必要に応じて微調整を行ってください  
(速度を上げる→開度を開くなど)
- ◆ 使用後は粒剤散布タンクと散布機内部の残留物を取り除きましょう



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記載しましょう。