

2021
10月号
Vol.67

担い手 サポートセンター

通
信



写真上：JAおやま 肥育農家 伊沢 春幸さん、訓男さん
写真下：JAかみつが 水稻・園芸農家 小倉 稔さん

CONTENTS

サポートセンター情報	頑張る担い手インタビュー !!	2	園芸情報	とちぎが誇るにっこり梨	11
サポートセンター情報	Z-GIS 導入	4	肥料情報	土づくり通信	12
共済情報	季節農業用自動車保障特約	5	農薬情報	殺ダニ・殺虫剤 サフオイル乳剤	13
中央会情報	緊急水田情報	6	農業機械情報	中古農機お買い得位置	14
米麦情報	稲・大豆の技術対策	8	生活情報	JA食材センターからのお知らせ	15
米麦情報	麦作の安定生産に向けて	9	野生を食べる／編集後記		16
生産振興情報	加工トマト機械栽培者募集	10			

頑張る担い手インタビュー!!

▶ JAおやま 下野市
伊沢 春幸 さん (43 歳)
肥育牛 (交雑種) 250 頭
(霧降高原牛、日光高原牛)
就 農: 23 年目



JA おやま 伊沢 春幸 さん、訓男 さん

本日は、肉牛の肥育が盛んなJAおやまから、霧降高原牛、日光高原牛でおなじみの肉牛（交雑種）を肥育している伊沢さんをご紹介します。

▶ 経営概況と就農までの経緯を教えてください。

両親が肉牛の肥育農家ですので、子供のころから手伝いをしていました。後を継いで肥育をすることは決めておりましたから、高校は農業高校の畜産科で学び、県内の肥育農家後継者との出会いがしたくて、農業大学校の畜産課に進みました。卒業後、宮崎県の肥育農家に研修に入り、20歳から両親とともに肉牛の肥育をしており、現在250頭の肥育をしています。



▶ 肥育へのこだわりについて教えてください。

丁寧に餌をやること、牛の状態を細かく見ること、です。一般的に素牛は生後8か月位のものを買付け肥育しますが、私は生後2か月の小さい牛を買付けてミルクから肥育します。小さいから細かく牛の状態を見なければなりません。6か月間で揃った牛に育てます。また、よく育った牛は小さな窪みでも立てなくなり、死亡事故につながりますのでこまめな観察が必要です。



▶ 肥育の魅力を教えてください。

自分の思ったとおりに育った時の達成感です。毎日の給餌と牛の状態を観察しながら、個々の牛の生育に合った世話をする。結果が出た時は最高です。

▶ 肥育に苦労されていることは何ですか？

肉牛は目方がないとお金になりません。どうやって餌を食べさせるか。夏は食欲が落ちるので食べなくなる。痩せると肉質が落ちます。肉質が落ちないように食べさせる。また、導入する「血統」と「餌」との相性も大きく関係するので、素牛の買付けから気を使います。

▶ これからの目標は何ですか？

規模は現状維持ですが、肉質の良い肥育を目標にこれからも進めたいと思います。

JAグループ栃木の交雑種販売促進委員会の副会長もしている春幸さんですが、インタビューには父親の訓男さんにも同席していただきお話を伺いました。共励会で年間11回も賞を取ったことがあるとのこと。肥育にかける情熱が伝わってきました。本日はお話ありがとうございました。

頑張る担い手インタビュー!!

▶ J Aかみつが 日光市 沓掛
小倉 稔さん (71 歳)
作 物：水稲 250a (コシヒカリ、あさひの夢)
アスパラガス 16a (ウェルカム)
さといも 10a (女早生)
就農開始から：10 年目



本日は、JAかみつが管内で水稲・アスパラガス・さといもに取り組んでいる小倉稔さんをご紹介します。

▶ 就農までの経緯を教えてください。

兼業農家として水稲を栽培していましたが、会社を定年退職し、農業を本格的に始めました。定年前よりアスパラガスを定植しておき、退職後すぐに収穫ができるような準備をして水稲とアスパラガスの複合経営を始めました。アスパラガスは独学で始めましたが、部会内の取組や指導のお陰でうまく軌道に乗せることが出来ました。


▶ さといもの湛水栽培をされているとお聞きしました。

2年前にさといもの湛水栽培を始めました。湛水栽培のメリットとしてコガネムシ幼虫による食害が無くなるので正品率の向上が見込めます。ただ、圃場選びにおいて上手にかけ流しができる圃場を選ぶ必要があります。



▶ さといも栽培のメリットを教えてください。

さといも栽培は、栽培の途中で手がかからない上、水稲とアスパラガス栽培の合間に作業をすることができます。去年より湛水栽培に適した肥効調節型肥料を試験し追肥の省力化が図れるように取り組んでいます。また、毛羽取機を導入し作業性の向上にも努めています。



▶ これからの目標は何ですか？

今後は娘が就農する予定です。ぶどう栽培を行う他、さといもも40aに規模拡大するので、良いバックアップができるように支援していきたいです。

見事なぶどうハウスも見学することができ、大変勉強になりました。本日はお忙しい中対応いただきありがとうございました。



Z-GIS

全農 営農管理システム

圃場管理について、

こんなことを思ったことはありませんか…？



毎年大きい白地図を広げて
作付計画を記入するのが大変…

親しか知らない圃場があるけど、
場所はどこだろう…

圃場数が多くなってきて、
作業を覚えきれない…

そもそもこれといった
圃場管理はしていない…

ひとつでも
当てはまった方！

**Z-GISを使って
効率の良い圃場管理を始めませんか！？**


Z-GISとは…

地図上の圃場の形に合
せて作成したポリゴン（圃場）
とExcelで管理した圃場の情報を
紐づけて管理するクラウド型の営
農管理システムです。これまで紙
（白地図やノート）で管理していた
圃場情報をデジタル化し、クラウド
にデータを保管することによっ
て、一つのファイルを複数名で
管理することができます！



全農

JAの自動車共済



季節農業用自動車保障特約

JAの自動車共済(主契約)に季節農業用自動車保障特約を付加することで、特定の農機具を所有・借用の台数に関係なく、「対人賠償」「対物賠償」「自損事故」を保障します。

農業には欠かせない農機具。その大切な農機具での万が一の事故の保障を考えてみませんか。
お得な共済掛金で、充実の保障を!農機具事故の保障は、JAの自動車共済で♪

この特約の共済掛金は、
対人無制限、対物無制限
(免責0万円、対物超過修理費用保障あり)の場合


3,880円

12か月の年払契約にのみ付加できます。月払契約は付加対象外です。期間途中で特約を付加された場合も、年間掛金3,880円となります。(令和2年4月1日時点)

主契約



トラクター




軽トラック

など

季節農業用自動車保障特約




田植機



刈取脱穀作業車




農業用薬剤散布車



野菜移植機



収穫機



摘採機

対象となる
農業用自動車
の一例

- 田植機(歩行型含む)
- 野菜移植機(汎用型)/玉ねぎ移植機/レタス移植機
- コンバイン(自脱型・普通型)/バインダー
- 野菜収穫機(汎用型)/ビーンハーベスター/さつまいも収穫機
- 動力摘採機(茶刈機)
- スピードスプレーヤー/ブームスプレーヤー/自走式の農業用薬剤散布車 など

(注) 主契約となる車種には、対象車種の制限はありません。上記は一例に過ぎません。

保障内容

- ◆ 運転中・作業中に他人をケガさせてしまったら… **対人賠償**を保障
- ◆ 運転中・作業中に他の自動車とぶつかったら…… **対物賠償**を保障
- ◆ 運転中・作業中のケガや万一の時には…… **自損事故**を保障


生産者の皆様へ

緊急水田農業情報(令和3年9月)

需給バランスの改善のため飼料用米等の 非主食用米に作付転換しましょう!


栃木県の状況

栃木県産米は在庫量が大幅に増加し、相対取引価格が下落
民間在庫の推移と栃木県産コシヒカリ相対取引価格の推移



全国の状況

主食用米需要量が、年々右肩下がり減少



米穀データバンクでは、
**全国の作況は102で、
生産量が710万トン
以上になると推計**
(7月末時点)

このままでは

米価の下落が止まりません

栃木県農業再生協議会

4年産の作付
どうしよう?




水田で取り組みやすい飼料用米を作しましょう!

●各種助成を活用することで、主食用米並みの収入を得ることができます。

飼料用米の10aあたり収入目安

※R3年産の助成単価を基に試算しています。
R4年産については今後決定していきます。



飼料用米に対する主な支援内容

- 1 産地交付金(市町設定)…**0~9,000円/10a**
 ●市町が設定する生産性向上に資する取組に基づいた生産の場合
 ※市町(再生協)によって設定の単価が異なります。
- 2 産地交付金(複数年契約)…**12,000円/10a**
 ●実需者との既存の複数年契約(3年以上)に基づいた生産の場合
 ※R4年産の新規契約分については未定
- 3 戦略作物助成…**55,000~105,000円/10a**
 ●収量に応じて55,000円~最大105,000円(+150kg以上の場合)
 ※栃木県のR2年産飼料用米の平均交付実績額は83,030円

収量性が高い品種で、単収アップを目指しましょう!!

稲・大豆の技術対策（10月）

J A 全農とちぎ 米麦部

水 稻

1 適期収穫

6月田植の刈取適期は平年で出穂後45～50日です。出穂期が8月25日頃ですと、10月10～15日頃となります。帯緑色粳率（穂の基の方で黄緑色をした粳の割合：不稔を除く）10～3%が刈取り適期です。**刈り遅れは胴割粒の発生が急増**するなど等級・食味の低下の大きな要因となります。刈遅れないように早めに準備しておきましょう。



☆「とちぎの星」は、成熟期が近づくと葉先に赤い斑点ができるいわゆる「赤上がり」になります。遠くから見ると葉が赤茶けて見えることがありますが、品種の特性で、特に問題はありません。

2 適正な乾燥・調製

高温年は胴割粒が発生しやすいです。乾燥・調製は丁寧に行い、胴割粒の発生を防止しましょう。張り込み時は水分を確認し、急激な乾燥は胴割を誘発するので毎時乾減率は0.5～0.8%以下とし、仕上げの玄米水分は、14.5%となるようにします。なお、過乾燥および高水分（15.1%以上）にならないよう、乾燥調製に注意しましょう。

粳摺は、適正な乾燥後、粳の温度が下がってから脱ぶ率が80～85%となるようゴムロールの間隙を調整して行います。乾燥が不十分であったり、粳温が高いと肌ずれが発生するので注意しましょう。

3 早めに稲わら鋤き込み

本田の準備は、収穫後の秋耕から始まります。**秋耕で稲わらを鋤込むこと**によって、春までに半分の稲わらを腐熟させ、土の中で堆肥を作ることとなります。

また再生稲（ひこばえ）は、ヒメトビウンカの増殖源や縞葉枯病ウイルスの伝染源となる恐れがあるため、収穫後は速やかに鋤込みましょう。秋耕は雑草の塊茎を冬の寒さに晒すことで来年の雑草防除効果もあります。耕深は15cm以上とし、秋まさりのイネとなります。ロータリー耕でも速度を落として耕起すれば、通常のトラクターで充分耕深を確保できます。



再生稲（ひこばえ）の縞葉枯病発病の様子

大 豆

1 適期収穫

収穫時期は例年10月下旬から11月上旬です。汚損粒発生を防止するため、子実水分が18%以下（爪を立てると少し子実に跡が残る程度、歯で噛むと割れる程度）になったら収穫しましょう！収穫は晴天の10～17時ころに行うようにします。

収穫が遅れると、しわ粒や皮切れ粒になる危険があるので、適期収穫を心がけましょう！



麦作の安定生産に向けて


J A 全農とちぎ 米麦部

1 連作の回避・輪作体系の確立

麦は畑作物です。畑作物は輪作することが大前提です。麦の品質・収量を安定させるには、連作をしないことが重要です。連作により、①収量・品質が低下しやすい（細麦化・高蛋白質化）。②病気（麦縹萎縮病・萎縮病・なまぐさ黒穂病等々）や養分欠乏症（Mn・Mg欠等）が出やすい。③雑草が発生しやすい等の障害が深刻化してきます。


2 徹底した排水対策

麦は播種時・生育期・登熟期の全栽培期間を通じて湿害を受けやすい作物です。排水対策のポイントは、①団地化、②地表排水（排水溝設置）、③浸透排水（プラソイラ等による心土破碎）です。



3 土づくり

麦類は酸性に弱く土壌が酸性化すると生育・収量に大きく影響します。播種前に、pH6.5を目標に、苦土炭カル等を施用します。pHが5.5以下になると生育不良となり、5.0以下では発根が抑制され2月頃株全体が黄化して枯死するか、湿害を受けたように下葉が枯れ上位葉も黄化し短稈で茎数不足となります。



4 適期播種

適正な播種時期の目安は、年内に適切な葉齢を確保し（寒冷地ほど年内の葉齢・生育量は多く必要）、根張りを十分にさせると同時に、目標穂数の8割以上の茎数（500～600本以上/m²）を確保できる時期です。

年内に確保すべき葉齢は、県中北部では3～4.5葉、県南部では2.5～4葉です。年内積算気温と生育ステージとの関連性から各地域の播種適期は次のとおりです。

県北部地帯： 11月1日～10日（黒磯10月23日～11月4日）

県中部地帯： 11月6日～15日（宇都宮11月2日～11月13日）

県南部地帯： 11月9日～18日（佐野11月2日～11月14日）

※（ ）内は年内年平均気温積算値450～300℃となる日。

※ 気象庁の季節予報（1か月、3か月、寒候期予報）も参考にして播種時期を決めます。

気温が高い（暖冬）予報の時は5日程度遅らせ、低い（寒冬）予報の時は5日程度早めます。

加工トマト機械栽培者募集

こんな方にオススメです！

- ①水田転作の作物として、大規模に作付けする品目を探している方（おおむね1ha以上）
- ②法人・集落営農で、夏季の労働力を有効に活用して収益拡大を狙う方
- ③投資や単価変動リスクをさけて無理なく安定的に所得を確保したい方

加工トマト機械栽培の特徴について

- ◆面積契約で**全量出荷**できます！（出荷規格適合品）
- ◆**価格が事前に決定**しています！（令和3年産価格：47円/kg）
- ◆出荷経費（運賃、コンテナ代等）はかかりません！
- ◆定植機・収穫機は**無償貸与**です！
- ◆**短期間**で収穫可能です！（20a/日の収穫能力）
- ◆**定期的に技術指導**を実施しています！



上記以外にも支援メニューをご用意しています♪
1ha未満の作付をご検討の方でもお気軽にご連絡ください！



©栃木県 とちまるくん

機械収穫作業のイメージ(中型収穫機)



収穫面積	20㍏/日
作業人員	6～7名
運転	1名
選別	3～4名
伴走車運転	2名
収穫効率（箱/日/人）	
手収穫	10～40箱
中型収穫機	70～95箱



【問合せ先】 全農とちぎ 担い手支援課（担当：星田） TEL:028-616-8838



とちぎが誇るにっこり梨！ 秋の味覚にいかがでしょう



園芸部流通対策課

食えると思わず“にっこり”。とてもジューシーな甘みが、食べた人を“にっこり”させることからこんな名前に。味の良い『豊水』と豊満な『新高』から生まれて平成8年8月に品種登録された栃木県農業試験場生まれのオリジナル品種です。とにかく大きくて味が濃い、甘くてみずみずしい梨。お歳暮用にもおススメです。



★見分け方のポイント3つ

- ①張りと重みがある
- ②色ツヤが良い
- ③おしりに放射状の線がある

★保存方法について

保存期間は2か月！
紙袋に入れてからビニール袋に入れて冷暗所に置けば、お正月までおいしさそのまま。



にっこりの食べ方



梨は軸側よりもお尻側のほうが糖度が高めの傾向にあります。そのため縦に等分するクシ形切りで食べるのがおすすめです。にっこりは糖度が高めの梨ですが、こうすれば甘みにばらつきはできません。

量が多くて食べきれそうになれば、レモン汁を加えてジャムにしても Good！

土づくり通信 Vol.5

水稻の安定的な生産を長期的に持続させるためには、水田への有機物施用が欠かせません。稲わらの鋤き込みは地力増進をはかる重要な有機質資源ですので、適切な資材を施用し、圃場の地力を維持することが大切です。

～主要な稲わら腐熟促進資材のラインナップ～

No	区分	チラシ (例)	現物写真 (例)	①成分例 ②荷姿(例) ③施用量(反) ④形状 ⑤販売業者	特徴
1	石灰窒素 (マイクログリン等含む)			①TN>19% ②20kg ③20～40kg ④粒・粉・顆粒 ⑤KCA、デンカ他	1.窒素が稲わら分解の微生物の増殖を促します。 2.腐熟が進むと有機酸が生じて酸性となり、微生物の増殖も遅れて分解が弱まりますが、石灰が約60%含まれるので、微生物活性に最適な微酸性～中性の条件を維持します。
2	わらゴールド			①TN=約2% ②15kg ③30～45kg ④ペレット ⑤富士見工業	1.鶏ふんを主体とした有機物に稲わらを分解促進する微生物を配合しています。 2.ペレット状で散布しやすいです。 3.15kg袋で2～3袋/反の施用です。
3	ワラ分解王			①TN=約4% ②20kg ③20kg ④ペレット ⑤KCA	1.広範囲な温度で稲わらを分解する8種の微生物(セルロースとリグニン分解菌)が含まれている資材です。 2.ペレット状で散布しやすいです。 3.有機物が含まれています。 4.20kg袋で1袋/反の施用です。
4	ワラ分解キング			①- ②10kg ③10kg ④顆粒 ⑤KCA	1.特に低温でも稲わらを分解する微生物(ワックスとセルロース分解菌)が含まれている資材です。 2.稲わらが湿った状態の施用がより効果的です。 3.春施用の場合は代かき45日前に鋤き込みます。 4.顆粒状で機械散布が出来、10kg/反で省力的です。
5	アグリ革命			①- ②2kg×10 ③2kg ④顆粒 ⑤東日本くみあい飼料他	1.稲わらを分解する酵素が含まれている資材です。土壌環境の影響を受けにくい特徴があります。 2.稲わらが湿った状態の施用がより効果的です。 3.顆粒状であり、2kg/袋を1袋/反で省力的です。 4.撒きムラが無いように均一に散布します。
6	アグリ革命アクア		-	①- ②100mL×10 ③100mL ④液状 ⑤東日本くみあい飼料他	1.稲わらを分解する酵素が含まれている資材です。土壌環境の影響を受けにくい特徴があります。 2.液状であり、100mL・1本/反で10～500Lの水に希釈し、動噴・ブーム等で散布します。 3.混用可能な除草剤もある。

※ 銘柄により若干内容が異なる可能性があるため、必要に応じてご確認ください。

※ これらは一例のため他にもさまざまな資材があります。

※ 使用方法等は地域や土壌により若干異なる場合がありますため、詳しくは最寄りの営農部門等にご確認ください。

稲わらの分解が不十分だと…

① 作物が窒素飢餓になる

土壌中の微生物が窒素(主にアンモニア)を吸収利用しようとするため、作物の吸収する窒素が不足し、作物生育が阻害される

② 土壌中の酸素が不足する

水田では微生物の増殖により土壌中の酸素が少なくなり、還元が進んだ物質、有機酸や硫化水素が発生し、作物の養分吸収が阻害される。(ガスわきの発生、根腐れ)

③ 作業機械、特に田植機の能率と精度が悪くなる

稲わらが耕うん機、田植機などに絡まる



ガスわきの発生



根腐れの様子

編集記者からのポイント！

稲わらの分解は微生物の働きなので、地温の高い秋鋤き込みが腐熟促進に効果的です。



※土壌に約3か月埋設した時の稲わら



殺ダニ・殺虫剤

サフオイル乳剤

Suffoil

5ℓ ボトルが新発売!!

300倍希釈で薬液が1500ℓ 作れます



◎はOATアグリオ㈱の登録商標

やっかいなハダニ類を
しっかり防除

殺ダニ効果


ハダニ類の全生育ステージに高い効果

殺卵効果

高い孵化抑制効果

残効性

1週間程度の残効



コナジラミ類を防除し
ウィルス病を予防

殺虫効果

コナジラミ類の幼・成虫に高い効果

殺卵効果

高い孵化抑制効果

忌避効果

作物への定着を阻害

交尾阻害効果


交尾行動を阻害し、次発生を抑制



展着剤の加用がおすすめ

展着剤加用でさらなる防除率アップ!

～有効な展着剤の選択～



試験機関 : 大塚化学(株) (現 OATアグリオ(株))
 処理日 : 2009年8月28日および9月4日
 散布流量 : 500mℓ/株
 作物(品種) : なす(千両二号)
 試験方法 : 散布0, 3, 7, 10および14日後に1株につき中位葉4葉に寄生するナミハダニ雌成虫数を調査した。

天敵・有用昆虫への影響が
小さく、IPM防除にも最適

展着剤加用でより均等に混ざりやすく!

～薬害の軽減～



- サフオイル乳剤は、攪拌直後は均等に混ざりますが、時間経過とともに有効成分と水が分離していき、濃度差が起こります。
- 濃度差が起こると薬害の発生するおそれがある為、展着剤の加用をお勧めします。
- 調製後、速やかに散布を行ってください。

さまざまな野菜類に使えます



JAグループ栃木/全農とちぎ

中古農機 お買得市

所属する
JA農機センター
より**事前予約**の上
ご来場を
お願いします

ご来場者特典

ご来場者様に
粗品を
ご用意しております。

開催日 **11/11 木** 9:00~15:00

抽選日 **11/12 金**

！ 栃木県内において緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が適用された場合は展示会を中止する場合があります。

50台以上の展示を
予定しております

**中古農機展示会
11月11日**

※展示会にて購入希望者が重複した商品については**翌12日の抽選会**にて購入者を決定いたします。

完全予約制

※新型コロナウイルス感染対策として来場者を分散し、4部入替え制とさせていただきます。

〈1部〉 9:00 ~ 10:20

〈2部〉 10:30 ~ 11:50

〈3部〉 12:00 ~ 13:20

〈4部〉 13:30 ~ 14:50

ご来場をご希望の方は最寄りのJA農機センターまでご連絡ください。

会場 JA全農とちぎ 農機総合センター
住所: 宇都宮市上桑島町1459-2

主催 JAグループ栃木/全農とちぎ

お問い合わせ先

全農とちぎ 農業機械課

TEL **028-616-8842**

会場案内図



※予約がない場合は入場できません。予めご了承ください。

JAの楽チン♪ おかず

和・洋・中
バランスよく
お届けします

お申込み・お問い合わせは
各食材センター まで

おかずコース

冷凍



1ヶ月/24食分

13,920円

税込15,024円

選べる
2タイプ

お弁当コース

冷凍



1ヶ月/24食分

16,800円

税込18,144円

常温



レンジで温めるだけで
簡単に炊き上がる
パックご飯付♪

おいしさを「ひとつ一つ味わう」

京風 新含気おせち

早期割引締切日：11月18日(木)



ワンスプーン



本格おせちをあなた好みに
アレンジしてみませんか



カナッペ風



大皿盛り



めもと盛り



モダン盛り

JA全農とちぎ 生活総合課

〒321-0905 平出工業団地26-4

TEL:028-664-2990

FAX:028-664-3305



野生を食べる 139 シロカノシタ

漢字では「鹿の舌」と書く。傘の表面はつるつるであるが裏側は針状になっているので舌を連想したのだろう。軸が短く地面に張り付いたようで形も様々である。コナラを主体とした広葉樹林で10月以降、比較的普通に見られる。私的には本命のシメジが全く採れない日、仕方がないのでカノシタでも拾って帰ろうという位置づけだ。持ち帰るには特別な扱いが必要。肉質がもろく壊れやすい。土も付きやすく落とすのが大変になる。専用の袋に入れ、きれいに土を落としたものだけを入れる。でないとほぼ食用にならない。



料理メモ

日本では古くから食べられ、ヨーロッパでも美味しいキノコの一つにされているが、最近、毒成分が見つかったという。これまで何度も食べており、なんともなかったのが大丈夫と思うが、念のため一度湯がいてから使うといい。そのほうがしっかりした肉質になる。写真1は「天ぷら」。これは生のまま揚げている。外はカリッと中はジューシー、キノコ臭もあり、結構いける。写真2は「けんちん汁」。写真撮影上、汁の上にはカノシタが見えるが、同時に採集した数種のきのこが使用されている。このほうが旨い。写真3は「佃煮風」。水、酒、砂糖、醤油で水気がなくなるまで煮込み、最後にバターで風味をつけた。

(aida)



写真1



写真2



写真3

編集後記

10月号も最後までお読みいただきありがとうございました。いよいよ食欲の秋本番になりますので、今年こそは誘惑に負けないように頑張りたいです！
(菅原)

発行：JA全農とちぎ 担い手支援課

TEL 028-616-8838

FAX 028-616-8819

生産者のみなさまへ



LINE@
友だち募集中!

ID: @jatochisaposen



コードを読み取るか、IDで検索

担い手サポートセンターが

生産者のみなさまを

LINEを通してしっかりサポート!

