

令和2年産 大豆栽培記録 (提出用)

◎栽培記録の記帳及び農業生産工程管理(GAP)の徹底を図り、高品質で安全・安心な富山県産大豆を生産しましょう。

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| 住 所 | | 電話番号 | |
| 生産者名・組織名 | | 代表者氏名 | |

| | | | |
|-------|-----------------------|------|---|
| 品 種 名 | <u>えんれいのそら</u> ・シュウレイ | 栽培面積 | a |
|-------|-----------------------|------|---|

| |
|---------|
| 指導員確認欄 |
| 10月 / 日 |
| |

| | | | | |
|------|------|-------------|-------|------------|
| 排水対策 | 心土破碎 | 5月15日～5月31日 | 額縁排水溝 | 3月26日～4月7日 |
| は 種 | は種日 | 5月29日～6月4日 | は種量 | 5.9 kg/10a |

| 区 分 | | 肥料名 | 使用月日 | 施用量 |
|------|--------|-------|------------|------------|
| 土づくり | 有機質資材 | 発酵鶏糞 | 5月23日～6月2日 | 100 kg/10a |
| | 土壌改良資材 | 苦土石灰 | 5月23日～6月2日 | 100 kg/10a |
| | | | 月 日～月 日 | kg/10a |
| 施肥 | 基 肥 | BB084 | 5月29日～6月4日 | 23 kg/10a |
| | | | 月 日～月 日 | kg/10a |

| 農 薬 名 | | 摘 要 | 使用月日 | 使用量 | |
|-------|------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 種子消毒 | 一発処理 | クルーサー MAXX | (塗沫) | 5月24日～月 日 | 8 ml/種子1kg |
| | 塗沫 | クルーサー FS 30 | (塗沫) | 月 日～月 日 | 6 ml/種子1kg |
| | | ネビゲン R-2 フロアブル | (塗沫) | 月 日～月 日 | 20 ml/種子1kg |
| | 粉衣 | ネビゲン | (粉衣) | 月 日～月 日 | 乾燥種子の1% |
| | | | 月 日～月 日 | | |

| 農 薬 名 | | 散布時期・散布量 | 使用月日 | 使用量 |
|-------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 粒 剂 | トレフアナサイド 粒剂 | 播種直後 (4～6kg/10a) | 月 日～月 日 | kg/10a |
| | ラカサー 粒剂 | 播種直後 (4～6kg/10a) | 5月29日～6月4日 | 6 kg/10a |
| | | | 月 日～月 日 | kg/10a |
| 雑草防除 | 大豆バサゲラン液剂 | 2葉期～開花前 (100～150ml/水100l) 雑草茎葉散布 | 月 日～月 日 | ml/10a |
| | | 2葉期～開花前 (300～500ml/水100l) 軟間雑草茎葉散布 | 7月20日～8月5日 | 350 ml/10a |
| | ホルトフロアブル | イネ科雑草3～10葉期 (200～300ml/水100l) 雑草茎葉散布 | 7月20日～8月5日 | 200 ml/10a |
| | ラウンドアップマックスロード | 軟間雑草 (200～500ml/水100l) 軟間処理 | 月 日～月 日 | ml/10a |
| | エトトップ P乳剂 | 播種直後 (400～600ml/水100l) | 月 日～月 日 | ml/10a |
| | バスタ液剂 | 軟間雑草 (300～500ml/水100～150l) 軟間処理 | 月 日～月 日 | ml/10a |

※裏面へ

| | | | | | | |
|----|-----|-------------|-----|------------|-----|---------|
| 培土 | 1回目 | 6月22日～6月25日 | 2回目 | 7月2日～7月13日 | 3回目 | 月 日～月 日 |
|----|-----|-------------|-----|------------|-----|---------|

| | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 畝間かん水 | 月 日～月 日 | 月 日～月 日 | 月 日～月 日 | 月 日～月 日 |
|-------|---------|---------|---------|---------|

| 病 害 虫 防 除 | 薬名 | | 対象病害虫 | 使用月日 | 使用量 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| | 粉 剤 | 基本 | スミチオンベルコート粉剤 DL | マメソウカイガ、カメムシ類等 | 月 日～月 日 |
| マネートレボン粉剤 DL | | | 紫斑病、カメムシ類等 | 月 日～月 日 | kg/10a |
| 随時 | | ダントツH粉剤 DL | フタスジヒメハムシ類等 | 月 日～月 日 | kg/10a |
| | | トレボン粉剤 DL | ハスモンヨトウ、カメムシ類等 | 月 日～月 日 | kg/10a |
| 液 剤 | ベルコートフロアブル 1000倍液 | 紫斑病、ハスモンヨトウ、カメムシ類 | 月 日～月 日 | 倍液 | ℓ |
| | スミチオン乳剤 1000倍液 | | | 倍液 | ℓ |
| | アミスターレボン SE | 紫斑病、カメムシ類 | 8月25日～月 日 | 8 倍液 | 0.8 ℓ |
| | | | 月 日～月 日 | 倍液 | ℓ |
| ラ ジ ヘ リ | 委託先 | | 使用月日 | 使用量 | |
| | ・JA | ◎その他(ドローン) | 月 日～月 日 | | |
| | フロランダム乳剤 | 紫斑病 | 8月14日～月 日 | 24 倍液 | 0.8 ℓ |
| | スミチオン乳剤 | カメムシ類 | 8月14日～月 日 | 8 倍液 | 0.8 ℓ |
| 随 時 | | | 月 日～月 日 | /10a | |
| | | | 月 日～月 日 | /10a | |

※ 上記以外の資材を使用した場合は、空欄に記入願います。

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|------|------|--------|
| 収穫期 | 刈取予定日 | 10月10日～10月20日 | 乾燥調製 | JA施設 | その他() |
|-----|-------|---------------|------|------|--------|