


# 「コシヒカリ」の栽培基準

※この栽培基準はJA米の栽培基準を兼ねています

生育経過

目標収量	540kg/10a
m <sup>2</sup> 当たり穂数	400本
1穂着粒数	70粒
登熟歩合	87%
玄米千粒重	22.5g



栽培管理



水管理



栽培管理のポイント

- ①② 浸種・播種
 

浸種日	播種日	田植日	育苗日数
4/16	4/26	5/15	19日
- ③ 田植え ……5月15日を中心に田植え
 

田植時期	植付株数	植付本数	植付深さ
5月15日	70株/坪	3〜4本/株	3cm
- ④⑤ 田植え後1か月以内に中干し開始
 

開始目安	植付株数	茎数
	70株/坪	15〜16本/株

  - 中干し前に溝掘りを行いましょ。溝掘りは5〜6m間に1本(15〜20条)
  - 額縁状に掘り、排水口に連結しましよ
- ⑥ 穂肥(分肥)
 

肥料名	出穂15日前	出穂8日前
追肥3号	8〜10kg	10〜12kg

※詳細は施肥設計例のページ参照

- …目標穂数の80%
- ⑦ 病虫害防除 (10a当たり)
 

時期	薬剤名	散布量
基本① 穂揃期	ビームスタークル粉剤5DL	4kg
基本② 傾穂期	キラップ粉剤DL	4kg

※詳細は病虫害防除体系のページ参照
- ⑧ 収穫
  - 籾の黄化率85〜90%で適期刈取り

刈取り時期の目安
出穂後40日頃

稲作編